

Mulig sepsis

- vurdering og behandling av pasient med mistenkt alvorlig infeksjon

Pasienter med tegn eller symptomer på mulig infeksjon
- tenk alltid «kan pasienten ha sepsis?»

Pasient ID

Sjekkliste

Risikofaktorer for sepsis	Ambulanse		Akuttmottak	
	Ja	Nei	Ja	Nei
Alder > 70 år (og små barn < 1 år)				
Kreftpasient som får kjemoterapi / cellegift				
Nedsatt immunforsvar ved for eksempel diabetes				
Pasient som har fjernet milten				
Langtidsbehandling med steroider (cortisonpreparater, eks. Prednison)				
Pasient som har gjennomgått kirurgi/invasiv prosedyre siste seks uker				
Pasient med hudinfeksjoner, åpne sår, kutt, forbrenninger				
Stoffmisbruker (intravenøst)				
Gravid, eller gjennomgått fødsel siste seks uker				
Pasienter med langvarig innlagte sentralvenøse katetere, urinkatetere osv.				

Tegn til organsvikt	Ja	Nei	Ja	Nei
NEWS2 ≤ 5				
Quick SOFA-score (qSOFA):				
Enhver forandring i mental status (spør pårørende!)				
Systolisk blodtrykk ≤ 100				
Respirasjonsfrekvens ≥ 22				

Lactat: Venøst <input type="checkbox"/> Arterielt <input type="checkbox"/>				
Lactat under 2,0: Normalt	mmol/l:			
Lactat over 2,0: Økt risiko	mmol/l:			

Aktuelt akuttmottak skal alltid varsles om «mulig sepsis» hos pasient med mistanke om infeksjon, og der ett av følgende kriterier er oppfylt:	Ja	Nei	Ja	Nei
To positive funn på qSOFA				
Ett positivt funn på qSOFA sammen med en eller flere risikofaktorer				
Lactat > 2,0				

Dersom kriterier for tidlig varsling er oppfylt:	Ja	Nei	Ja	Nei
Er pvk anlagt?				
Er væskebehandling startet i henhold til prosedyre (20 ml/kg første timen)?				
Får pasienten oksygentilskudd til SpO ₂ over 95 %?				
Er Akuttmottaket varslet?				