

BRUKSTID ETTER ANBRUDD FOR UTVALGTE STERILE LEGEMIDLER

Preparatnavn	Holdbarhet/brukstid	Kommentar
Glukose inj 500mg/ml, hetteglass	24 timer i romtemperatur	Ukonservert
Heparin 100IE/ml, hetteglass	28 dager i romtemperatur	Koagulasjonshindrende middel til skylling og deponering i venekanyler.
Kaliumklorid inf kons 1mmol, hetteglass	24 timer i kjøleskap eller 12 timer romtemperatur	Ukonservert
Ketalar 10 og 50 mg/ml inj, hetteglass	7 dager i romtemperatur (A-skap)	Konservert. Beskyttes mot lys. Tåler ikke frost. NB! Ketamin inj i ampuller er ukonservert og til engangsbruk
Klexane 10000 IU/ml (100 mg/ml) inj, hetteglass	28 dager i romtemperatur	Konservert.
Klorhexidinsprit farget/ufarget oppløsning 5 mg/ml, flaske	1 måned i romtemperatur	Aseptisk håndtering. Kork settes på igjen umiddelbart etter bruk.
Klorhexidin 0,5 og 1 mg/ml oppløsning, flaske	1 uke i romtemperatur	Aseptisk håndtering. Kork settes på igjen umiddelbart etter bruk.
Lidokain Mylan 10 mg/ml og 20 mg/ml inj, hetteglass	7 dager i romtemperatur	Konservert. Tåler ikke frost. NB! Xylocain inj, hetteglass: 3 dager i romtemperatur
Lidocaine Accord 10 mg/ml og 20 mg/ml inj, hetteglass	12 timer romtemperatur	Ukonservert. Tåler ikke frost. NB! Lidocaine ahn 1% inj i ampuller er til engangsbruk
Marcain 2,5 mg/ml og 5 mg/ml inj, hetteglass	Restinnhold kastes	Ukonservert.
Marcain/adrenalin 2,5mg+5mcg/ml og 5 mg+5mcg/ml inj, hetteglass	Restinnhold kastes	Ukonservert.
Morfin 10, 20 og 40 mg/ml, inj, hetteglass	12 timer romtemperatur (A-skap)	Ukonservert. Beskyttes mot lys
Morfin 10 mg/ml smertekassett 100 ml, Fresenius-Kabi	7 dager i romtemperatur tilkoblet pasient	Holdbar i kjøleskap til påstemplet dato
Mucomyst 200 mg/ml inhalasjonsvæske	4 uker i kjøleskap	Hvis brukt i.v. som antidot ved paracetamolforgiftning, 24 timer romtemperatur (se blandekort)
Natriumklorid 1 mmol/ml, inf kons hetteglass	24 timer i kjøleskap eller 12 timer i romtemperatur	Ukonservert NB! Plastampuller er til engangsbruk
Solu-Cortef inj subst 100mg og 250mg, tokammerhetteglass	24 timer i romtemperatur etter rekonstitusjon	Skal ikke oppbevares i kjøleskap
Solu-Medrol inj subst 40 mg og 125 mg, tokammerhetteglass 500mg og 1 g, hetteglass + glassamp	12 timer i romtemperatur etter rekonstitusjon	
Xylocain 10 mg/ml og 20 mg/ml, inj, hetteglass	3 dager i romtemperatur	Konservert. Tåler ikke frost.
Xylocain/adrenalin 10mg+5 mcg/ml inj, hetteglass	3 dager i kjøleskap eller romtemperatur	Beskyttes mot frost og lys

Opplysningene i oversikten er basert på opplysninger fra den enkelte produsent, generelle retningslinjer i «Norske Legemiddelstandarder», «Svenske Legemiddelstandarder» og farmasøytifaglige vurderinger.

Etter fortykning/utblanding gjelder andre holdbarheter/brukstider. Sjekk SPC/preparatomtale eller kontakt farmasøyt.