

Pasient ID	klokkeslett		kryss av	
	Ankomst pasient		MONA beh gitt per.hosp/ in.hosp	
	Smertedebut		Morfin	
			Oksygen (ved SaO ₂ < 90 %)	
			Nitroglyserin	
			ASA/Acetylsalisylsyre	
			Blodtrykk etter MONA	

Ansvarlig lege stiller spørsmålene nedenfor og setter ring rundt svaret

Infarktsuspekterte smerter i minst 15 minutter?	Ja	Nei	
Smertevarighet i mindre enn 6 timer?	Ja	Nei	
Alvorlig skade eller stor operasjon siste tre uker?	Ja	Nei	
Tidligere hjerneslag eller hjerneblødning?	Ja	Nei	
Blødning fra magesår eller tarm siste måneden?	Ja	Nei	
Pasienten bruker Marevan®, Pradax®, Xarelto®, Lixiana® eller Eliquis®?	Ja	Nei	
Kjent sykdom med økt blødningstendens?	Ja	Nei	
Systolisk blodtrykk > 180 eller diastolisk blodtrykk > 110 etter MONA?	Ja	Nei	
Gravid, eller fødsel siste uken?	Ja	Nei	
Annen alvorlig sykdom (som sykdom i hjernen eller kreft)?	Ja	Nei	

Actilyse besluttet gitt Ja Nei

Ansvarlig lege:

Forberedelse til ACTILYSE	
<input type="checkbox"/> 2 stk grove PVK	
<input type="checkbox"/> Koble til 500 mg natriumklorid infusjonsvæske med treveiskran, la væsken gå raskt slik at du ser at PVK ligger riktig, sett deretter ned hastigheten. Actilysen skal gis i treveiskranen.	
<input type="checkbox"/> Sett på defibrillerings pads, og koble til hjertestarter.	

Pasientens **alder** (år):

Pasientens **vekt** (kg):

Velg riktig tabell **OVER 75 ÅR** eller **UNDER 75 ÅR** på neste side

UNDER 75 ÅR

Klargjøring av medisiner

Bland begge actilysepakkene: hvert ferdigblandet hetteglass inneholder 50 ml Actilyse med styrken 1 mg/ml

Finn frem Plavix 300mg

Finn frem og trekk opp Klexane 30 mg → $30 \text{ mg} : 100 \text{ mg/ml} = 0,3 \text{ mg}$

Trekk opp 1. dose bolus av Actilyse etter tabell

Klargjør 2. og 3. dose Actilyse etter tabell

Administrering av medisiner

1	PLAVIX 300 mg tbl	gitt kl.			
2	KLEXANE gis intravenøst	gitt kl.			
3	Gi ACTILYSE etter tabellen nedenfor:				
	Vekt	1. dose BOLUS gis over 1 min	2.dose INFUSJON gis over 30 min	3.dose INFUSJON gis over 60 min	Total mengde Actilyse
	40	9 mg	30 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet:160 mg/t Dråpetakt: 50/min	21 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet: 71 mg/t Dråpetakt: ca 25/min	60 mg
	45	10 mg	34 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet:168 mg/t Dråpetakt: 50/min	23 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet: 73 mg/t Dråpetakt: ca 25/min	67 mg
	50	11 mg	38 mg tilsettes i 100 mg NaCl Hastighet:276mg/t Dråpetakt: 100/min	26 mg tilsettes i 100 mg NaCl Hastighet: 126mg/t Dråpetakt: ca 50/min	75 mg
	55	12 mg	41 mg tilsettes i 100 mg NaCl Hastighet:282 mg/t Dråpetakt: 100/min	29 mg tilsettes i 100 mg NaCl Hastighet:129 mg/t Dråpetakt: ca 50/min	82 mg
	60	14 mg	45 mg tilsettes i 100 mg NaCl Hastighet:290 mg/t Dråpetakt: 100/min	31 mg tilsettes i 100 mg NaCl Hastighet:131 mg/t Dråpetakt: ca 50/min	90 mg
	65	15 mg	49 mg tilsettes i 100 mg NaCl Hastighet:298 mg/t Dråpetakt: 100/min	34 mg tilsettes i 100 mg NaCl Hastighet:134mg/t Dråpetakt: ca 50/min	98 mg
	> 65	15 mg	50 mg tilsettes i 100 mg NaCl Hastighet:300 mg/t Dråpetakt: 100/min	35 mg tilsettes i 100 mg NaCl Hastighet:135mg/t Dråpetakt: ca 50/min	100 mg
		BOLUS gitt kl.	Startet kl.	Startet kl.	
4	KLEXANE: Ferdigfylte sprøyter til subcutan injeksjon. Gis etter at alle tre doser med Actilyse er gitt.				
	Vekt	Dose	Antall mg		
	50-69 kg	60 mg	0,6 mg		
	70-89 kg	80 mg	0,8 mg		
	≥ 90 kg	100 mg	1,0 mg		
	Gitt kl.				

OVER 75 ÅR

Klargjøring av medisiner

Bland 1. actilysepakke: hetteglasset inneholder 50 ml Actilyse med styrken 1 mg/ml

Finn frem Plavix 75 mg

Trekk opp 1. dose bolus av Actilyse etter tabell

Klargjør 2. og 3. dose Actilyse etter tabell

Administrering av medisiner

1	PLAVIX 75 mg tbl	gitt kl.			
2	Skal ikke ha Klexane intravenøst				
3	Gi ACTILYSE etter tabellen nedenfor:				
	Vekt	1. dose BOLUS gis over 1 min	2.dose INFUSJON gis over 30 min	3.dose INFUSJON gis over 60 min	Total mengde Actilyse
	40	4,5 mg	15 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet: 130mg/t Dråpetakt: 50/min	10,5 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet: 60,5 mg/t Dråpetakt: ca 25/min	30 mg
	45	5 mg	17 mg tilsettes i 50mg NaCl Hastighet: 134 mg/t Dråpetakt: 50/min	11,5 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet: 61,5 mg/t Dråpetakt: ca 25/min	33,5 mg
	50	5,5 mg	19 mg tilsettes i 50mg NaCl Hastighet: 138 mg/t Dråpetakt: 50/min	13 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet: 63 mg/t Dråpetakt: ca 25/min	37,5 mg
	55	6 mg	20,5 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet: 145 mg/t Dråpetakt: 50/min	14,5 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet: 64,5 mg/t Dråpetakt: ca 25/min	41 mg
	60	7 mg	22,5 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet: 290 mg/t Dråpetakt: 100/min	15,5 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet: 65,5 mg/t Dråpetakt: ca 25/min	45 mg
	65	7,5 mg	24,5 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet: 149 mg/t Dråpetakt: 50/min	17 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet: 67 mg/t Dråpetakt: ca 25/min	49 mg
	> 65	7,5 mg	25 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet: 150mg/t Dråpetakt: 50/min	17,5 mg tilsettes i 50 mg NaCl Hastighet: 67,5mg/t Dråpetakt: ca 25/min	50 mg
		BOLUS gitt kl.	Startet kl.	Startet kl.	
4	KLEXANE: Ferdigfylte sprøyter til subcutan injeksjon. Gis etter at alle tre doser med Actilyse er gitt.				
	Vekt	Dose	Antall mg		
	50-69 kg	40 mg	0,4 mg		
	70-89 kg	60 mg	0,6 mg		
	≥ 90 kg	80 mg	0,8 mg		
	Gitt kl.		mg		

Prehospitale forhold:

- Actilyse er et medikament som har tilsvarende egenskaper, virkning og bivirkninger som Metalyse. På grunn av Metalysemangel, er det aktuelt med Actilyse intrahospitalt i stedet for Metalyse. Pasienten får en bolus, så to infusjoner på hhv 30 og 60 minutter. Behandlingen startes intrahospitalt, men pågående infusjon under ambulansetransport til regionssykehus er aktuelt. Ha alltid pads påkoblet underveis.
- Ved transport av pasient med pågående Actilyseinfusjon bør ambulansespersonellet ha telefonnummer direkte til avleverende lege for eventuelt spørsmål underveis. **Tlf.**
- Avleverende avdeling har ansvar for å blande infusjonene og merke disse med tidsangivelse og dråpetakt.
- Avleverende lege eller intensivsykepleier gir ambulansespersonellet nøye rapport over forhold som kan bli aktuelle under transporten.
- Ved syst. BT over 180 underveis i transport til OUS: konsulter avleverende lege. Det kan være aktuelt å avbryte infusjonen.
Alle konsultasjoner skal være med avleverende avdeling/lege.
- Ambulansespersonell utfører infusjonen ved manuell telling av dråpetakt. For infusjon på 30 minutter er tidsbruk 25-35 minutter akseptabelt. For infusjon på 60 minutter er 50-70 minutter akseptabelt.
- Ambulansespersonell har ansvar for å sette Klexane s.c. etter siste infusjon (se tabell over).