



## Desinfeksjon - Kjemisk desinfeksjon

D07373

 Utgave:  
5.01

 Gjelder fra:  
27.08.2024

Side 1 av 1

### Hensikt og omfang

Hindre smittespredning via utstyr og eller overflater.  
Omfatter utstyr som ikke tåler eller er for stort til å kjøres i dekontaminator.

### Ansvar/målgruppe

Leder og den enkelte ansatt.

### Handling

#### Krav

Desinfeksjonsmidlet skal være godkjent av Statens legemiddelverk, og oppbevares i låsbart skap.

Be leverandør beskrive hvordan utstyr skal desinfiseres før innkjøp av nytt utstyr.  
Unngå innkjøp av utstyr som ikke kan varmedesinfiseres eller desinfiseres med midler godkjent av Statens legemiddelverk.

#### Fremgangsmåte

- Ulike desinfeksjonsmidler har ulikt virkeområde.
- Følg brukerveiledningen for utblanding av desinfeksjonsmiddelet.
- Bruk anbefalt beskyttelsesutstyr i forbindelse med utblandingen.
- Blandes ut på originalflasken, aldri på sprayflasker.
- Sett på dato for når kjemien (desinfeksjonsmiddelet) blir blandet ut.
- Sjekk holdbarhetsdato hvis det er en ferdig løsning.
- Enkelte desinfeksjonsmidler kan påvirke materialer som metall, gummi, plast, m m .
- Enkelte desinfeksjonsmidler kan også gi missfarging på tøy.

#### Etter endt virketid

- Ta opp gjenstanden og skyll bort desinfeksjonsmidlet.
- Vask evt. med såpe og vann.
- Lufttørke eller tørke med rent papir/tekstil.

#### Referanser

[EX.01.02-01](#)
[EX.01.02-02](#)
[EX.01.02-03](#)
[EX.01.02-05](#)
[EX.01.13-10](#)
[EX.01.13-11](#)
[Basale smittevernrutiner](#)
[Håndhygiene - hånddesinfeksjon og håndvask](#)
[Basale smittevernrutiner - Usterile engangshansker](#)
[Beskyttelsesutstyr: frakk, munnbind, åndedrettsvern, sko \(rombundet\)](#)
[Desinfeksjon - Virkon. Plakat blandingsprosedyre](#)
[Desinfeksjon - PeraSafe. Plakat blandingsprosedyre.](#)