Bakteriologisk prøve - MRSA			D07383	
Utgave: 4.06	Utarbeidet av: Seksjon smittevern i SI	Godkjent av fagdirektør Toril Kolås	Gjelder fra: 06.05.2024	Side 1 av 2

- Rekvisisjon merkes med: "MRSA-screening-pasient" eller "MRSA-screening-personale".
- Utstyr: eSwab fra Copan og spatel. Se bilde.
- Prøvene sendes til: SI-Lillehammer, Lab. for mikrobiologi, 2629 Lillehammer.

Ved stort volum av prøver ved smitteoppsporing eller epidemi: kontakt mikrobiologisk lab. på tlf 61272904 eller 61272905. Unngå å sende prøver på torsdag eller fredag.

Den som tar prøven, bruker hansker, munnbind og smittefrakk.
Prøven tas tidligst 2-3 dager etter at man kan ha vært utsatt for smitte.

PASIENTER

Risikokategori	Antall prøver	Prøve tas fra (en rekvisisjon pr. prøveglass)
Alle pasienter	1 prøveglass fra hvert sted (3 prøveglass)	- Ytterst i begge nesebor - Svelg, inklusiv tonsiller - Perineum
Eventuelt	1 prøveglass fra hvert sted	- Sår/eksem/ferske arr (obs. hender, hodebunn, øyelokk, øregang) eller andre defekter i huden - Innstikksteder for fremmedlegemer (dren, trakeostomi, intravaskulære katetre, shunter) - Kateterurin

PERSONALE

Risikokategori	Antall prøver	Prøve tas fra (en rekvisisjon pr. prøveglass)
Screening	1 prøveglass fra hvert sted	- Ytterst i begge nesebor - Svelg, inklusiv tonsiller
Eventuelt	1 prøveglass fra hvert sted	- Sår/eksem/arr (obs. andre defekter i huden-hender, hodebunn, øyelokk, øregang)

Slik skal prøven tas

Nese:	Prøve tas fra innsiden av begge nesebor (*vestibulum nasi).* Penselen stikkes ca. 1 cm inn i neseåpningen og roteres 3 ganger rundt hele omkretsen av neseboret. Samme pensel til begge nesebor.
Hals:	Gni penselen over begge tonsiller og bakre svelgvegg.
Sår/eksem/arr:	Ved prøve fra sår og lignende vaskes eventuelt synlig puss bort med sterilt saltvann før prøvetaking.

	Ved prøvetaking fra tørre områder, fuktes penselen med sterilt vann/saltvann før prøvetaking. En pensel til hvert område.
Perineum:	Tas fra området foran endetarmsåpningen.
Kateter, dren o.a. fremmedlegemer:	Ta prøve fra huden rundt innstikkstedet.
Urin:	Ta prøve av urin ved permanent kateter.
Begge øreganger (ved symptomer f.ek.s øregang-eksem)	Pensel roteres rundt i ytre del av øregangen. Samme pensel til begge øregangene.

Referanser

EX.01.02-01	Basale smittevernrutiner
EX.01.02-02	Håndhygiene - hånddesinfeksjon og håndvask
EX.01.02-03	Basale smittevernrutiner - Usterile engangshansker
EX.01.07-02	Kontaktsmitte, dråpesmitte, Kohortisolering
Metodebok	