



## Blærekreft - Intravesical behandling med BCG

D07943

Utgave:  
6.00Gjelder fra:  
01.09.2021

Side 1 av 1

### Hensikt og omfang

- Sikre at forberedelser og administrering av medikamentet blir utført korrekt
- 6 behandlinger med en ukes mellomrom, deretter kan det gis serier med 3 behandlinger
- Antall behandlinger bestemmes av urolog

### Ansvar/målgruppe

Uroterapeut eller sykepleier som har fått opplæring, etter henvisning fra ansvarlig urolog/lege.

### Handling

#### Behandling

- Gi informasjon, skriftlig og muntlig, til pasienten om behandlingen, bivirkninger og forholdsregler under behandlingen. Se [Informasjon fra kreftlex](#).
- Ta urinstix. Behandlingen skal utsettes ved infeksjon og blødninger, eventuelt behandles med antibiotika – konferer med urolog.
- Bland BCG i 50 ml NaCl. Bruk en sprøyte med luerlock og trekk opp NaCl som deretter kobles på – M.E.R.C.I.-blandingssett for installering i lukket system. Koble hetteglasset til blandingssett og fyll 2-3 ml NaCl slik at pulveret løses opp, og dra deretter dette tilbake i 50 ml-sprøyten. Oppløsningen skal stå utblandet i 2-3 minutter før bruk.
- Sett inn et engangskateter for å tømme blæren. Kontakt urolog dersom dette er vanskelig.
- BCG settes deretter inn i blæren

Viktig at medikamentet holdes i blæren 2 timer.

Ved første behandling skal pasienten være på sykehuset de to første timene for å observere eventuelle bivirkninger/reaksjoner.

#### Etter behandling

- Slå 2,5 dl Klorin i toalettet og vent 15 minutter med å spyle ned.
- Behandle avfallet som [Risikoavfall - Legemiddelrester og legemiddelglass/flasker \(sorteres som smitteavfall\)](#)
- Husk å dokumentere og kode i DIPS

#### Referanser

[SI/25.02-20](#)

[Risikoavfall - Legemiddelrester og legemiddelglass/flasker \(sorteres som smitteavfall\)](#)