

→ Transvesical prostatektomi (TVP)

Ved åpen prostataoperasjon fjernes prostatakjertelen gjennom et snitt på magen. Denne metoden anvendes ved store prostatakjertler. Operasjonen utføres vanligvis i spinalbedøvelse. Under operasjonen legges det inn et kateter gjennom urinrøret til blæra og det første døgnet vil det gå kontinuerlig skyllevann gjennom kateteret for å skylle blæra ren for blod.

Etter operasjonen

- Etter operasjonen blir du liggende på oppvåkningsavdelingen i ca 3–5 timer.
- Du kan spise og drikke som normalt.
- Du har fått lagt inn et urinkateter, og et sårdrain som drenerer blodvæske fra sårområdet. Drainet fjernes dagen etter operasjonen, urinkateteret fjernes vanligvis etter 5 dager.

Etter hjemkomst

Vannlating

Den første tiden kan vannlatingen være hyppig og komme brått på. Dette vil vanligvis bedre seg gradvis. Det er også vanlig med blod i urinen de første ukene etter operasjonen.

Blødninger

2–3 uker etter operasjonen vil det løsne skorper fra sårflatene inne i blæra. Dette kan medføre en forbigående blødning. Dersom blødningen ikke er kraftig og vannlatingen går bra, er det ikke nødvendig å kontakte lege.

Tynge løft og fysiske anstrengelser kan utløse blødning. Derfor skal du unngå dette de første ukene etter operasjonen.

Har du problemer med treg avføring, anbefales å bruke Laktulose-mikstur. Det å presse hardt for å få avføring, kan utløse blødning.

Sædavgang / seksualfunksjon

Hos mange blir sæden tømt bakover til blæren. Hos de pasienter hvor dette skjer, er muligheten for å få barn betydelig redusert, men ikke utelukket.

Ereksjonssvikt forekommer sjelden etter denne type prostataoperasjon.

Mer informasjon

Du finner også informasjon på:

- www.nofus.no (NOFUS – Norsk forening for personer med urologiske sykdommer)
- www.helsebiblioteket.no

Spør oss hvis du lurer på noe.

Vennlig hilsen

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet

Tlf. 915 06 200 | www.sykehuset-innlandet.no