

Gastroskopi - Utstyr og gjennomføring, gastrolab.

D37629

 Utgave:
2.00

 Gjelder fra:
28.11.2018

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

Sikre riktig behandling ved gastroskopi - forberedelse, utførelse og etterbehandling

Ansvar/målgruppe

- Sykepleier på gastrolaboratoriet klargjør utstyr, informerer og forbereder pasienten
- Lege utfører prosedyren og sykepleier assisterer
- Sykepleier/helsepersonell på sengepost informerer og forbereder inneliggende pasienter

Handling

Utstyr

- Gastroskop med ventiler
- Steril vannflaske fylles med sterilt vann eller det brukes et lukket engangssystem
- Engangs sugokolbe m/slange
- Minifom 100 mg/ml og medisinglass
- Bedøvelsesspray og sprayrør
- Spatel
- Bitering
- Plastkopp til tannproteser
- Engangs arbeidsforkle og hansker til lege og sykepleier (ev. visir)
- Helicobacter test – følg prosedyre: [Ulcus - Behandling](#)
- Biopsitang og andre instrumenter etter behov
- Biopsiglass med m/Formalin 4%
- Pinsett

Utførelse

- Kontroller at ventiler og o-ringer er i orden før de settes i skopet
- Test scopet på blåsing, suging, spyling, lys og hvit-testing
- Informer om undersøkelsen
- Administer analgetika og sedativa etter legens forordning
- Gi Minifom 10 dråper utblandet i 10-20 ml vann
- Gi bedøvelsesspray i svelget
- Fjern eventuelle tannproteser
- Sett inn bitering
- Legg pasienten i venstre sideleie med hodet lett bøyd mot brystet
- Legg «kladd» på pasientens bryst (beskytte for søl)
- Smør scopet med Xylocain gel før det føres ned
- Sykepleier observerer, tar seg av pasienten og assisterer legen
- Observasjon av pasienten etter utført undersøkelse, avhenger av hva som er gjort og hva som er gitt av medikamenter

Utgave: 2.00	Gastroskopi - Utstyr og gjennomføring, gastrolab.	D37629 Side 2 av 2
-----------------	--	-----------------------

- Scop og brukt utstyr rengjøres umiddelbart etter undersøkelsen (1)

Etter behandling

- Pasienten skal holdes fastende i ½ - 1 time etter undersøkelsen, dersom det er gitt bedøvelsesspray i svelget. Sårhet og ubehag i svelget kan forekomme.
- Videre oppfølging etter legens forordning
- Ved medisinerings med analgetika og sedativa bør pasienten ikke kjøre bil før det har gått 24 timer

Referanser

[SI/17.09-09](#)

[Gastroskopi - Forberedelse og observasjon, inneliggende](#)

[SI/17.09-25](#)

[Ulcus - Behandling](#)

[SI/17.28.03.09-11](#)

[Pasientinformasjon - Gastroskopi](#)

Eksterne referanser

1. Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - dekontaminering og lagring (Mai 2018) [Internett]. Tilgjengelig fra:
[\[https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/fleksible-endoskop-og-endoskopisk-tilleggsutstyr-innen-gastroenterologi-dekontaminering-og-lagring\]](https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/fleksible-endoskop-og-endoskopisk-tilleggsutstyr-innen-gastroenterologi-dekontaminering-og-lagring). [Nedlastet november 2018].