

Fødsel - Feber under fødsel og chorioamnionitt

D39936

 Utgave:
3.03

 Gjelder fra:
07.06.2023

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

- Sikre riktig behandling av mor og barn ved feber under fødsel
- Forebygge utvikling av alvorlig sepsis hos den nyfødte
- Prosedyren linkes direkte til aktuelt kapittel i Veileder i fødselshjelp 2020
- Aktuelle oppgaver for jordmor beskrives i tillegg

Ansvar/målgruppe

- Leger og jordmødre

Handling

- Følg kapittel [Feber under fødsel og choramnionitt](#)

Oppgaver for jordmor før/under fødsel

- Mål temperatur, helst rektalt
- Registrer blodtrykk og puls
- Ta urinprøve til stix og dyrkning på indikasjon (klinikk eller temp. > 38,5 – 39,0)
- Bestill blodprøver som forordnet
- Kontinuerlig fosterovervåkning, følg [Fødsel - Fosterovervåkning](#)
- Senk romtemperatur
- Rehydrering: Væske oralt og i.v. (Ringer Acetat eller NaCl)
- Febernedsettende Paracetamol: Forventet effekt etter 20-30 minutter.
 - 1 g x 4 - 6 pr os
 - 500 – 1000 mg supp. x 3-4 rektalt
 - Ev. i.v. maks x 4
- Mål temperatur 30 – 60 min. etter tiltak

Oppgaver for jordmor etter fødsel

Mor

- 2 timer etter fødsel: Registrer vitale parametre i Metavision, følg [ONEWS - Ansvar og gjennomføring](#) og utfør klinisk respons

Barnet

- Mål temperatur x 3 de første 2 døgn
- Kontakt barnelege ved følgende infeksjonstegn:
 - Ustabil/stigende temperatur
 - Slapphet
 - Dårlig sugeevne
 - Respirasjonsbesvær, økt respirasjonsfrekvens - >60/min
 - Puls >160 slag/min
 - Irritabilitet
 - Forandring i hudfarge

Referanser[SI/17.24-17](#)[SI/17.24-42](#)[SI/17.24-44](#)[Fødsel - Fosterovervåkning](#)[Fødselshjelp - Veileder](#)[ONEWS - Ansvar og gjennomføring](#)