

Ulcus - OAM 10 dager, standard 1. linjekur mot helicobacter pylori

Utgave:	3.00
Gjelder fra:	14.03.2022
Side:	1 av 2

Resept

Pasientdata:

Rp. Omeprazol tabl 20 mg, No 56
Dssn. 2 tabl. 2 ganger daglig i 10 dager.
Tas sammen med måltid.

Rp. Amoxicillin tabl 500 mg, No 30
Dssn. 1 tabl. 3 ganger daglig i 10 dager.
Tas sammen med måltid.

Rp. Flagyl tabl 400 mg, No 30
Dssn. 1 tabl. 3 ganger daglig i 10 dager.
Tas sammen med måltid.

Dato:

.....
Lege (stempel og signatur)

- Hovedårsaken til magesår er en kronisk infeksjon forårsaket av bakterien Helicobacter pylori. Får man bukt med denne bakterien gjennom en effektiv antibiotikabehandling, er sjansen stor for å bli frisk og ikke få tilbakefall av magesår.
- Du har fått foreskrevet en enkel trippelkur i 10 dager som består av en sterk syrehemmer (omeprazol, esomeprazol, pantoprazol eller lansoprazol) og to typer antibiotika, Amoxicillin og Flagyl. Det er vanligvis få bivirkninger forbundet med kuren. De vanligste er magesmerter, kvalme, løs avføring og metallsmak i munnen. Dette er ufarlige bivirkninger, og det er svært viktig å gjennomføre kuren. Hvis du er allergisk for penicillin må Amoxicillin erstattes med et annet antibiotikum. **Unngå alkohol** i behandlingsperioden.

Kontakt lege hvis bivirkningene blir plagsomme.

Syrehemmer tas 2 ganger daglig og de to antibiotikatablettene tas 3 ganger daglig - alle tablettene tas sammen med måltid.

- Etter 2 -3 måneder innkalles du til gastroskopi og/eller pusteprøve som viser om behandlingen har vært vellykket. Hvis symptomene kommer tilbake kontaktes egen lege.