

➔ Recto-/sigmoideoskopi og anorectoskopi

Undersøkelser av nedre del av tykktarm og analkanalen

Undersøkelsene gjøres for å kunne undersøke ulike sykdomstilstander i nederste del av tykktarm, endetarm og analkanalen. Det er mulig å ta vevsprøver under undersøkelsene.

FORBEREDELSE

Poliklinisk innkalling: Følg informasjonen i innkallingsskrivet for tømning av tarmen.

Er du inneliggende på sykehus, hjelper personalet deg med dette.

Undersøkelsesdagen kan du drikke og spise fritt.

Rectosigmoideoskopi: Endetarm og nedre del av tykktarmen undersøkes. En bøyelig slange (*coloskop*) føres via endetarmsåpningen og videre opp gjennom tykktarmen. Med coloskopet kan legen lyse opp og inspisere tarmen fra innsiden. Bilder fra tarmsystemet overføres til en videoskjerm som legen følger med på. Med instrumentet kan det også tas vevsprøver og polypper kan fjernes.

Undersøkelsen kan ta 15-30 minutter. Under undersøkelsen blåses gass, CO₂, inn i tarmen. Det kan kjennes spreng og gi avføringstrang. For å redusere eventuelle ubehag før eller under undersøkelsen, kan du spørre etter smertestillende og/eller beroligende medisin.

Anorectoskopi: nederste del av endetarmen undersøkes med et "rectoskop" som er et stivt rør med en lyskilde. Med denne inspiseres endetarmen og

slimhinnene omkring, vanligvis cirka 15 cm opp fra analåpningen.

Det er mulig å fjerne hemoroider og ta vevsprøver under undersøkelsen. Undersøkelsen tar ca 15-20 minutter.

KOMPLIKASJONER

Komplikasjoner forekommer meget sjeldent. Mulige komplikasjoner er at det kan gå hull på tarmen, en operasjon kan da bli nødvendig. Videre kan blødninger oppstå, men dette kan vi stoppe med forskjellige instrumenter, eventuelt operere.

ETTER UNDERSØKELSEN

Har du fått smertestillende eller beroligende medisiner, kan du ikke kjøre bil etter undersøkelsen.

Hvis du første dagen eller nærmeste dager etter undersøkelsen får unaturlige magesmerter, blødning eller feber, må du kontakte sykehuset.

Du vil få en kort orientering om resultatet av undersøkelsen, og svaret på undersøkelsen sendes til fastlegen. Noe spor av friskt blod er normalt den første dagen.

Har du spørsmål, kan du kontakte oss via sykehusets sentralbord.

Tlf. 915 06 200 | www.sykehuset-innlandet.no