

→ Behandling med botulinumtoxin (Botox) for skjeling

Botulinumtoxin er en naturlig gift som blokkerer nerveimpulsene til de musklene som blir injisert. Dette får musklene til å slutte å trekke seg sammen i noen uker. Ved skjeling injiseres stoffet i øyemuskler som jobber for kraftig.

Etter injeksjoner i øyemuskler vil du merke den første effekten normalt innen 3 dager. Maksimalt nivå oppnås 2-3 uker etter behandling.

BIVIRKNINGER

Botulinumtoxin skal svekke de injiserte musklene. Derfor forekommer ofte skjeling i motsatt retning enn den som skal behandles. Dette kan gi dobbeltsyn, svimmelhet og dårlig balanse. *Tilstanden er midlertidig.* Voksne pasienter kan ikke kjøre bil eller bruke maskiner i denne perioden.

Hos noen kan det også forekomme midlertidig nedfall av øvre øyelokk, økt tåreflom, irritasjon, tørre øyne, lysømfintlighet, hudutslett, tretthet, uklart syn, synsforstyrrelser eller hovne øyelokk. Blodutredelser kan oppstå under øyeslimhinnen.

Hengende øyelokk kan delvis motvirkes ved å sitte oppreist første to timer etter injeksjonen. Bivirkninger forekommer vanligvis i løpet av de første fem dager etter injeksjonen, og varer i noen uker.

BEHANDLINGSEFFEKT

Botulinumtoxin varer i ca 3 måneder. Behandlings-effekt er avhengig av pasientens evner til samsyn og type skjeling, samt øyets brytningsfeil og evne til å fokusere på nært (brillebehov). Behandlingen kan gjen-tas hvis det er nødvendig. Dosen kan økes ved senere behandling dersom startdosen ikke vurderes å være tilstrekkelig. Ny injeksjon bør ikke gis oftere enn hver tredje måned.

Spør oss hvis du lurer på noe.

Vennlig hilsen
Øyeavdelingen, Sykehuset Innlandet

Tlf. 915 06 200 | www.sykehuset-innlandet.no