



Øye - Strabisme, botuliniumtoxininjeksjon

D42245

 Utgave:
2.02

 Gjelder fra:
28.01.2022

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

- Behandling av skjeling
- Sikre korrekt fremgangsmåte ved botuliniumtoxininjeksjon
- Gjelder barn og voksne

Ansvar/målgruppe

- Leger med kompetanse på botoliniumtoxininjeksjon

Handling

Preoperativt

Ved operasjon i lokalanestesi

- Gi Paracetamol 1 g
- Gi ev. Sobril etter legens forordning
- Sørg for lue og frakk på pasienten
- Oxybuprokain dråper 0,4 %: 4 -5 dråper

Leie

- Ryggleie
- Hodet stødig i pute (vakuum)
- Pute under knærne
- Armene fri på polstrede armbord
- Gelepute under sete i operasjonsstolen/bordet

Huddesinfeksjon

- Klorhexidin 1mg/ml

Utstyr

- Kirurgisk pinsett, i egen kurv med utstyr og instrumenter
- Øyesperre
- Insulinsprøyte, 1 ev. 2 til hvert øye
- 2 vattpinner
- Oxybuprokain 0,4 % minims øyedråper til å fukte vattpinne
- Botox 1 hetteglass
- 1 x 2 ml sprøyte til utblanding av Botox i NaCl
- 1 grønn opptrekkskanyle
- NaCl 9 mg/ml, 2 ml
- Vaskesett m/tupfere
- Dekkestykke til bordet, klinikkduk 75x90cm
- Sterile kompresser 5x5 cm, non-woven, pakke a 2 stk
- Kloramfenikol 0,5 % minims
- Sterile hansker til lege og sykepleier

Utgave: 2.02	Øye - Strabisme, botuliniumtoxininjeksjon	D42245 Side 2 av 2
-----------------	--	-----------------------

- Dokumentasjonspapirer INSTRUMENTER UNDER OPERASJON

Utblending av botuliniumtoxin

- Legens oppgave
- **Hetteglasset må ikke ristes**, og det skal være vakuum i hetteglasset
- Trekk opp NaCl 9 mg/ml, 2 ml i sprøyten, tilsett i hetteglasset og bland godt
- Samme flaske med Botox-blanding kan brukes til flere pasienter og kan oppbevares i fryseren. Merk flasken med åpningsdato/blandet dato.

Postoperativt

- Informer pasienten om å sitte oppreist i 2 timer, hvorav ca. 15 minutter på dagposten
- Dokumenter sykepleiedokumentasjon i DIPS (Lege dokumenterer fortløpende)
- Lever papirdokumentasjon "INSTRUMENTER UNDER OPERASJON" til scanning

Referanser

[SI/17.28.03.26-05](#)
[SI/17.30.01-04](#)

[Pasientinformasjon - Botoxbehandling for skjeling](#)
[Behandlingslinje - Strabisme \(skjeling\) hos barn og unge under 18 år](#)