

HMAS - Nylig HMAS behandlet, Øyeblikkelig hjelp- kontakt pga redusert allmenntilstand og/eller feber

D42692	Utgave: 2.00	Gjelder fra: 05.05.2021	Side 1 av 2
--------	-----------------	----------------------------	-------------



Sykehuset Innlandet HF

Gjelder fra 05.05.2021

 Utarbeidet av: Seksjonsoverlege Even Reinertsen/seksjonsoverlege Aud Thoresen
 Godkjent av: Direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen

Ref.nr. SI/17.06-08 Utg.2.00

HMAS - Nylig HMAS behandlet, Øyeblikkelig hjelp-kontakt pga redusert allmenntilstand og/eller feber

Hensikt

Å sikre at undersøkelse, prøvetakning og effektiv behandling iverksettes så raskt som mulig hos pasienter som har gjennomgått HMAS (høydosebehandling med autolog stamcellestøtte) og er i aplasifasen (vanligvis innen 1 uke etter HMAS).

Dette er en pasientgruppe som pga aplasien (benmargssvikten) **MÅ** tas i mot umiddelbart av helsepersonell i akuttmottak, umiddelbart ta blodprøver og undersøkes av vakthavende LIS og straks deretter igangsette behandling dersom det er indisert. Det understrekes at antibiotikabehandling skal settes i gang umiddelbart etter prøvetakning og tilsyn av lege, dvs før prøvesvar foreligger. **(Innen ca 30 min fra ankomst)**

Målgruppe

Alt helsepersonell som som er i kontakt med denne pasientgruppen.

Fremgangsmåte

- Pasienten tas i mot på vanlig måte og BT, puls, respirasjonsfrekvens, REKTAL TEMP måles. Arteriell blodgass tas.
- Pasienten har Quinton kateter, men skal i tillegg ha iv-nål.
- Typiske symptomer er redusert allmenntilstand (diare, kvalme) og/eller feber (> 38 grader)
- Kontakt laboratoriet for prøvetakning, det tas HMAS-profil (egen profil i Dips).
- Kontakt samtidig vakthavende LIS som skal komme umiddelbart for å undersøke pasienten.
- Starte med væske iv; NaCl
- Denne pasientgruppa skal undersøkes i akuttmottak og starte med behandling der
- Denne pasientgruppa skal deretter på sengepost medisin.
- Hvis dårlig pasient – septisk - legges på intensiv avdelingen.
- Når det gjelder hygieniske tiltak skal personell som er forkjølet bruke munnbind.
- Se prosedyrene:
 - [HMAS - Empirisk antibakteriell behandling etter HMAS ved Myelomatose i nøytropen fase, 1.linje](#)
 - [Hemoterapi etter HMAS,allogen stamcelletransplantasjon og intensiv kjemoterapi](#)

Referanser

Utgave: 2.00	HMAS - Nylig HMAS behandlet, Øyeblikkelig hjelp- kontakt pga redusert allmenntilstand og/eller feber	D42692 Side 2 av 2
-----------------	---	-----------------------

[SI/17.06-05](#)

[HMAS - Empirisk antibakteriell behandling etter HMAS ved
Myelomatose i nøytropen fase, 1.linje](#)

[SI/17.06-07](#)

[Hemoterapi etter HMAS,allogen stamcelletransplantasjon og
intensiv kjemoterapi](#)