



## Fødsel - Stimulering av rier

D43420

 Utgave:  
4.00

 Gjelder fra:  
14.10.2024

Side 1 av 1

### Hensikt og omfang

- Definere fødselens ulike faser og beskrive tiltak ved langsom fremgang.
- Prosedyren henviser direkte til aktuelt kapittel i [Fødselshjelp - Veileder](#)

### Ansvar/målgruppe

- Leger og jordmødre

### Handling

- Følg kapittel [Stimulering av rier](#)
- Se også:
  - [Svangerskap/fødsel/barsel - Legemidler, administrert av jordmor etter prosedyre](#)
  - [Partus - Hurtig registrering av Oxitocininfusjon i Parogrammet.](#)

### Oxytocin

Utblanding	Dosering
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 IE (= 10000 mU) blandes i NaCl 0,9 % 1000ml eller Ringer Acetat 1000ml</li> <li>• Bruk infusjonspumpe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Startdose 30ml/time</li> <li>• Deretter øking hvert 15. minutt med 15ml/t</li> <li>• Maksdose 180ml/t</li> </ul>

### Referanser

[SI/15.03-61](#)
[SI/17.24-42](#)
[SI/17.24-86](#)
[Partus - Hurtig registrering av Oxitocininfusjon i Parogrammet.](#)
[Fødselshjelp - Veileder](#)
[Svangerskap/fødsel/barsel - Legemidler, administrert av jordmor etter prosedyre](#)