

Øye - Legemidler, administrering av Eylea

D44097

Utgave:
4.00

Gjelder fra:
23.09.2025

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

Sikre riktig administrering av legemiddelet Eylea med fokus på infeksjonsforebygging. Eylea benyttes for å hindre karnydannelse bak netthinnen.

Prosedyren benyttes ved mangel på ferdigfylte sprøyter fra sykehusapoteket ved SI Lillehammer.

Ansvar/målgruppe

Leger, spesialsykepleiere og sykepleiere ved Øyeavdelingen, SI Elverum.

Handling

- Klargjør utstyr:
 - 2 stk sterile dekkestykker 50x90 (ett til å dekke bordet og ett til å legge over til slutt)
 - Diatermipose (til å legge de ferdigoppfylte sprøytene i)
 - 1 ml sprøyte
 - 3 stk insulinsprøyter, evt. 3stk. 1 ml sprøyter + gul spiss (30G x ½)
 - 1 hetteglass Eylea 40 mg/ml m/filterkanyle
 - Alcotip
 - Sterile hansker
- Følg hygieniske prinsipper.
- Håndter legemiddelet under aseptiske forhold, på en operasjonsstue med avtrekk.
- Trekk opp Eylea via medfølgende filterkanyle i en 1ml sprøyte.
- Trekk så opp ønsket mengde 0,05 ml, fordelt på 3 insulinsprøyer. Innholdet i Eylea hetteglasset fordeles på 3 pasienter.
- Ved injeksjon av doble øyne; benytt 2 forskjellige hetteglass med ulikt batchnummer.

Referanser