

Legemidler - Blandekort, Acetylcystein

D44611

Utgave:
3.01Gjelder fra:
16.03.2023

Side 1 av 1

R05C B01	Sengepost/Intensiv				
	ACETYLCYSTEIN Mucomyst (Mylan) [®]				
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet RT= Romtemperatur K= Kjøleskap	Merknader
200 mg/ml Inhalasjons- væske* i hetteglass		Må fortynnes videre før bruk <u>Fortynningsvæske:</u> Glukose 50 mg/ml NaCl 9 mg/ml <u>Paracetamolforgiftning</u> <u>IV infusjon:</u> 1. dose: 200 mg/kg fortynnes med 500 ml fortynningsvæske 2. dose: 100 mg/kg fortynnes med 1000 ml fortynningsvæske	Administreres med volumpumpe <u>IV infusjon ved paracetamolforgiftning:</u> 1. dose gis over 4 timer 2. dose gis over 16 timer	Holdbarhet er inkludert brukstid! <u>Hetteglass:</u> 24 timer K <u>Fortynnet løsning/ kontinuerlig infusjon:</u> Glukose 50 mg/ml: 24 timer RT NaCl 9 mg/ml: 16 timer RT	*Benyttes intravenøst ved paracetamol- forgifninger. En fargeforandring (lys rosa/lilla) kan oppstå i åpnet beholder, men dette påvirker ikke preparatets sikkerhet eller effekt. Kan gi kvalme, brekninger og hudreaksjoner (rødme, kløe, urticaria)
<p><u>Kilder:</u> Statens legemiddelverk, norsk preparatomtale (SPC) – www.legemiddelverket.no – mars 2021 Giftinformasjonen – www.helsebiblioteket.no/forgiftninger - mars 2021 Norsk Legemiddelhåndbok – www.legemiddelhandboka.no - mars 2021</p>					