



Legemidler - Blandekort, Digoksin

D44618

Utgave:
3.00Gjelder fra:
29.07.2024

Side 1 av 1

C01AA 05	SENGEPOST/INTENSIV			
	DIGOKSIN Lanoxin (uregistrert)			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
0,5 mg/2 ml = 0,25 mg/ml = 250 mcg/ml Injeksjonsvæske Ampuller, 2 ml	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV injeksjon:</u> 1 del digoksin må fortynnes med minst 4 deler fortynningsvæske. <u>IV infusjon:</u> Fortynnes i 50-100 ml fortynningsvæske	Gis på volum-/sprøytepumpe <u>IV injeksjon:</u> Over minst 10-20 minutter <u>IV infusjon:</u> Gis vanligvis over 2 timer	<u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer RT	Rask administrasjon kan gi hypertensjon Kan gi svimmelhet, synsforstyrrelser, arytmier, kvalme og oppkast. Ekstravasasjon kan gi vevsskade. Legemiddelkonsentrasjonen må monitoreres Inneholder etanol. For konsentrert løsning kan gi utfelling. Følg anbefalt fortynning. <u>Antidot:</u> Digifab®
<u>Kilder:</u> Preparatomtale Lanoxin injection/infusion - EMC (medicines.org.uk) UCL Hospitals Injectabel Medicines Administration Guide 3rd ed 2010 Maler I MetaVision				