


**Legemidler - Blandekort, Deksklorfeniramin**

D44694

 Utgave:  
2.00

 Gjelder fra:  
29.07.2024

Side 1 av 1

R06AB02	AKUTTMOTTAK/INTENSIV/SENGEPOST			
	<b>DESKLORFENIRAMIN</b> Deksklorfeniramin NAF, Dexclorfeniramina Maleato Accord (ureg.)			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
5 mg/ml injeksjonsvæske  1 ml ampulle	Gis ufortynnet (SC/IM) eller fortynnes videre (IV)  <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml  <u>IV injeksjon:</u> <b>Konsentrasjon 1 mg/ml</b> 1 del Deksklorfeniramin 5 mg/ml fortynnes med 4 deler NaCl 9 mg/ml	<u>SC/IM injeksjon:</u> Gis ufortynnet  <u>IV injeksjon:</u> Bør fortynnes. Gis langsomt over 1-5 minutter	<u>Ampuller:</u> Engangsbruk  <u>Fortynnet løsning:</u> Brukes umiddelbart	Det kan oppstå en forbigående stikkende eller brennende følelse på injeksjonsstedet.  Kan gi arytmier, hypotensjon, hjertebank, døsighet, urinretensjon, uklart syn, munntørrehet, kvalme, oppkast, diare og hodepine.

**Kilder:**

 Preparatomtale [Dexclorfeniramina Maleato](#)

 Norsk legemiddelhandbok [Deksklorfeniramin](#)

 Micromedex [Dexchlorpheniramin - Dosing/Administration](#)

 Medicines complete [Chlorpheniramine maleate](#)