



Legemidler - Blandekort, Heparin natrium

D44696

Utgave:
2.00Gjelder fra:
14.12.2022

Side 1 av 1

B01AB01				
HEPARIN NATRIUM				
Heparin Panpharma/LEO 5000 E/ml, <i>konservert</i>				
Styrke	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
5000 E/ml injeksjonsvæske	<u>IV bolus:</u> Gis uforynnet.	<u>IV bolus:</u> Gis over 3-5 minutter. Maks 10.000 E.	Holdbarhet er inkludert brukstid.	Overdosering/ alvorlige blødninger kan behandles med Protaminsulfat®.
Hetteglass 5 ml	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml eller Glukose 50 mg/ml	<u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Etter legens ordinasjon.	<u>Hetteglass:</u> 28 dager K	*Dosering justeres vha APTT (aktivert partiell tromboplastintid)- målinger.
	<u>IV kontinuerlig infusjon, sprøytepumpe:</u> Konsentrasjon 500 E/ml: 5 ml fortynnes med 45 ml fortynningsvæske Konsentrasjon 100 E/ml: 1 ml fortynnes med 49 ml fortynningsvæske	Vanligvis initialt 10 E/kg/time, Maks initialt 1000-2000 E/time*	<u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer RT	Ved subkutan administrasjon benytt LMWH (Fragmin eller Klexane).
	<u>IV kontinuerlig infusjon, volumpumpe:</u> Konsentrasjon 40 E/ml: 4 ml fortynnes i 500 ml fortynningsvæske			
	Må blandes godt! Vend posen/sprøyten minst 6 ganger frem og tilbake.			
Kilder: Statens legemiddelverk, norsk preparatomtale (SPC) – www.legemiddelverket.no – desember 2022 Micromedex og UptoDate via www.helsebiblioteket.no – desember 2022				