


Legemidler - Blandekort, Fomepizole

D44996

 Utgave:
2.00

 Gjelder fra:
29.07.2024

Side 1 av 1

ANTIDOT

V03AB34

FOMEPIZOLE

Fomepizole®

Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
Infusjonskonsentrat 5 mg/ml* 20 ml ampulle	Skal fortynnes <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV infusjon:</u> Bruk 500 ml infusjonspose, trekk først ut og kast en mengde tilsvarende volum av beregnet dose. Gjenværende volum av fortynningsvæske må være minimum 100 ml.	<u>IV infusjon:</u> Gis over 30-45 minutter <u>Ved dialyse:</u> Startdose over 30-45 minutter, deretter 1 mg/kg/time	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer RT <u>Kontinuerlig infusjon:</u> 24 timer RT	*Svak konsentrasjon, det trengs mange ampuller for å få riktig dose.

Kilder:

 Preparatinformasjon [Fomepizole](#)

 Giftinformasjonssentralen [Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger \(Antidotlisten\) - Helsebiblioteket](#)

IBM Micromedex/Martindale via Helsebiblioteket