


# → Netthinnesykdom - injeksjonsbehandling

Netthinnesykdom, som aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), diabetesforandringer, kroniske regnbuehinnebetennelse (Uveitt) eller blodpropp (veneokklusjoner), behandles blant annet ved å sprøyte inn medisin i øyets glasslegeme.

Målet med behandlingen er å redusere hevelse/lekkasje i skarpsynsområdet og begrense ytterligere synstap. Dette er en behandling som må gjentas med jevne mellomrom. Effekten av de fleste injeksjonsbehandlinger varer ca. 4-6 uker til å begynne med. På kontrolltimer vil lege avgjøre om intervallet etter hvert kan forlenges. De vanligste medikamentene som brukes er Avastin, Eylea og Vabysmo. Noen medisiner brukes til et område de opprinnelig ikke var tiltenkt eller er godkjent for. Medisinene er likevel trygge og nøye utprøvd. Avastin er en slik medisin.



## INJEKSJONSBEHANDLINGEN

Injeksjonen foregår på en operasjonsstue. Du vil først få bedøvelse på øyet før det rengjøres med jodholdig desinfeksjonsvæske. Videre dekkes ansiktet med en steril hulleduk. En øyesperre vil holde øyet åpent og medisinen injiseres ved hjelp av en liten sprøyte. Behandlingen tar noen få minutter.

## ETTER BEHANDLINGEN

- "Bobler" og "små svarte bevegelige flekker" i synsfeltet kan forekomme. Det du ser er luftbobler i medisinen. Dette er ufarlig og forsvinner i løpet av få dager.
- Blødning kan forekomme, da blir det hvite i øyet rødt. Dette er ufarlig og kan ta 1-2 uker før det forsvinner.
- Svie og sårhet kan forekomme første døgnet. Øyesperren kan forårsake sår på hornhinnen. Dette er ufarlig, men kan være veldig ubehagelig.
- En av tusen pasienter kan utvikle infeksjon i øyet (endofthalmitt). Da blir øyet rødt, vondt, synet blir tåkete og det kan oppstå puss/verk. Merker du dette, må du ta kontakt snarest.
- Det forventes nedsatt syn samme dag som injeksjonen settes. Det frarådes bilkjøring samme dag.

*fortsetter neste side....*

### **Etter behandlingen må du passe på å**

- holde øynene mest mulig lukket injeksjonsdagen for å unngå tørre hornhinner
- ikke tørke eller gni øyet like etter injeksjonen

### **TA KONTAKT HVIS DU:**

- bruker antibiotika eller har nedsatt allmenn-tilstand
- har betydelig mengder puss i øyevippene eller har gjenklistrede øyne om morgenen

**Da må timen til injeksjon trolig utsettes.**

*Vennlig hilsen*

*Øyeavdelingen Elverum og Lillehammer*

**Tlf. 915 06 200** | [www.sykehuset-innlandet.no](http://www.sykehuset-innlandet.no)