



Hemodialyse - Forebygge blodsmitte

D45701

Utgave:
2.00Gjelder fra:
04.04.2024

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

- Sikre rutiner for å hindre blodsmitte i avdelingen
- Gjelder ved påvist antigen for Hepatitt B, Hepatitt C og HIV-infeksjoner, samt ved ukjent immunstatus for disse infeksjonene
- Alt blod skal håndteres som potensielt smitteførende

Ansvar/målgruppe

- Sykepleiere, leger og studenter som arbeider med hemodialyse
- Lege i samarbeid med sykepleier avgjør når isolering skal iverksettes og oppheves

Handling

- Behandling av pasienter med kjent blodsmitte foregår fortrinnsvis på samme behandlingsplass i avdelingen og på rom med få behandlingsplasser. Pasienter med adferd som utgjør en smitterisiko for andre skal behandles på enerom.
- Avfall etter på- og avkopling dialyse kastes i beholder for smitteavfall, som står ved siden av dialysemaskinen
- Gul smittefrakk skal benyttes ved fare for søl av blod på arbeidstøyet
- Ved AV fistel: Pasienten har egen staseslange, stetoskop, blodtrykksmansjett og tape som oppbevares i egen bakke på pasientrommet. Bruk munnbind med visir, vernebriller og munnbind eller verneskjerm/visir, samt gul smittefrakk ved fare for blodsøl, dvs. ved kanylering og fjerning av fistelnåler.
- Konsentratkanner med eventuelle rester settes til henting etter en gangs bruk.
- Etter avkobling fra hemodialysen, desinfiseres arbeidsbord, dialysemaskinens front og siden med dialysatkoblingene, med Virkon 1% /Saniswiss (sykepleierens ansvar). Virkon/ Saniswiss må også benyttes ved annet blodsøl. Ved blodsøl på tekstiler håndteres dette som smitte.
- "Blodsmitte" legges inn som kritisk informasjon i DIPS. Skriv på blodprøve-rekvisisjonen: «blodsmitte» under «merknad fra rekvirent».
- Generelle smitteverntiltak for øvrig, bruk: [Smittevern ansatte - Smitterisiko - Forebygging av blodsmitteuhell for ansatte](#)
- Ved ukjent immunstatus markeres på dialysekurven: Dato for serologi ("sikkerhetsprøver") i feltet for «Eventuelt». Signer på dialysekurven på gjeldende dato under «eventuelt» for opphør av karantene/blodsmitte.
- Henvisning til aktuelle prosedyrer dokumenteres i pasientens behandlingsplan under NIC: "Infeksjonskontroll"
- Ved spørsmål utover prosedyren, ta kontakt med hygienesykepleier. Husk å dokumentere pasientspesifikke avtaler i pasientens behandlingsplan.

Referanser

SI/10.01.08-09	Smittevern ansatte - Smitterisiko - Forebygging av blodsmitteuhell for ansatte
SI/10.01.08-10	Smittevern ansatte - Blodsmitteuhell - Tiltak for personell ved uhell med stikk/kutt/bitt/sprut/søl med blod eller kroppsvæsker
SI/17.34-01	Hånddesinfeksjon
SI/17.34-02	Håndvask
SI/22.02-01	Basale smittevernrutiner
SI/22.02-03	Smittevernutstyr - bruk av
SI/22.05-01	Isolering - Alfabetisk liste over infeksjonssykdommer
SI/22.05-03	Isolering - smitteregimer
SI/22.07.01-01	Desinfeksjonsmidler - kjemiske (tabell)
SI/22.07.03-01	Desinfeksjon - Utstyr og flater

Andersen, B.M. (2013) Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Oslo, Ullevål Universitetssykehus.

Folkehelseinstituttet (2023) Hepatitt B [Internett]. Oppdatert 26.06.2023 [hentet 2023-11-07]. Tilgjengelig fra: <https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/hepatitt-b---veileder-for-helsepers/>

Folkehelseinstituttet (2023) Hepatitt C [Internett]. Oppdatert 09.06.2023 [hentet 2023-11-07].

Tilgjengelig fra: <https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/hepatitt-c---veileder-for-helsepers/>

Folkehelseinstituttet (2004) Isoleringsveilederen. Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner [Internett]. [hentet 2023-11-07]. Tilgjengelig fra: [IsolasjonsrapportNY-040423.indd \(fhi.no\)](#)

Folkehelseinstituttet (2018) Hansker, Bruk av hansker reduserer i kombinasjon med håndhygiene risikoen for kryssmitte. [Internett]. [hentet 2023-11-07]. Tilgjengelig fra:

<https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/i-praksis/hansker-hudreaksjoner-og-negler/#ulike-typer-hansker>