

# ➔ Prostatabiopsi og blodfortynnende

## TIL DEG SOM BRUKER BLODFORTYNNENDE

► **Bruker du Marevan?** Denne medisinen er blodfortynnende og kan gi økt blødningsfare i forbindelse med biopsien. Mål INR 5 – 7 dager før du skal ta biopsi.

**INR under 3.** Stopp med Marevan to dager før den dagen du skal ta biopsi, dvs Marevan tas ikke dagen du skal ta biopsi og to dager før.

**INR er over 3.** Stopp med Marevan tre dager før den dag du skal ta biopsi, dvs Marevan tas ikke dagen du skal ta biopsi og tre dager før.

**Oppmøte.** Du må møte en time før oppsatt konsultasjonstid for å ta kontroll av INR verdi. Henvend deg i luken på laboratoriet for å ta blodprøve. Dette gjelder kun hvis du bruker Marevan.

Hvis du bruker Marevan på grunn av en innoperert hjerteklaff, er det mulig du må ha tillegg av blodfortynnende sprøyter i forkant av biopsien. Snakk med fastlegen din om dette.

► **Bruker du andre blodtynnende medikamenter som Pradaxa (Dabigatran), Xarelto (Rivaroksaban), Eliquis (Apiksaban), Lixiane (Edoksaban) eller Arixtra (fondaparinuks)?** Da må du gå til fastlegen for å få målt nyrefunksjonen (blodprøve) ca en uke før du skal ta biopsi.

**Normal nyrefunksjon.** Stopp med disse medisinene to dager før biopsien, dvs du skal ikke ta dem dagen du skal ta biopsi og to dager før.

**Nedsatt nyrefunksjon.** Snakk med fastlegen om hvor lenge du skal holde opp med disse medisinene. Ved tvil må fastlegen kontakte sykehuset.

► **Plavix, Clopidogrel, Efient eller Brilique er medisiner som virker på blodplatene og som også kan gi blødningsfare under biopsien.**

Disse medisinene skal avsluttes syv dager før du skal ta biopsien hvis ikke annet er avtalt. Har du i løpet av det siste året fått innoperert en stent i en kranspulsåre til hjertet, kan det være farlig å avslutte behandlingen med disse medisinene. Det vil vanligvis være en fordel å vente med biopsien til behandlingen med disse medisinene er avsluttet. Ta kontakt med fastlegen for å diskutere dette. Ved tvil må fastlegen kontakte sykehuset.

► **AlbylE, Acetyratio, Dispril og Globoid brukes som hjertemedisin i liten dose (75mg).**

Medikamentene brukes fram til dagen du skal ta biopsi, men ikke dagen du skal ta biopsi.

► **Persantin og Aponova.**

Medikamentene brukes frem til dagen før biopsien, men tas ikke selve dagen du skal ta biopsi. Hvis du bruker både Persantin/Aponova (dipyridamol) og Albyl-E(acetylsalisylsyre), skal du slutte med Persantin/Aponova fem dager før biopsi. Albyl-E kan du bruke til og med dagen før biopsi.

► **Diprasorin.**

Diprasorin inneholder både acetylsalisylsyre og dipyridamol og skal avsluttes 5 dager før biopsi.

► **Blodtynnende sprøyter som Fragmin eller Klexane for behandling av blodpropp.**

Som regel vil det kirurgiske inngrepet /biopsiene utsettes, men av og til er ikke det mulig. Snakk med fastlegen din om dette. Fastlegen bør rådføre seg med sykehuset.

*Spør oss hvis du lurer på noe.*

*Vennlig hilsen*

*Kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet*

**Tlf. 915 06 200 | [www.sykehuset-innlandet.no](http://www.sykehuset-innlandet.no)**