

Legemidler - Blandekort, Levetiracetam

D46447

Utgave:
2.00Gjelder fra:
29.07.2024

Side 1 av 1

N03AX14	INTENSIV/SENGEPOST			
	LEVETIRACETAM Keppra [®] , Kevesy [®]			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
100 mg/ml Infusjons- konsentrat Hetteglass à 5 ml Infusjonsposer 100 ml 5 mg/ml, 10 mg/ml, 15 mg/ml	Infusjonskonsentrat må fortynnes videre <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV infusjon:</u> Dose ≤ 1500 mg fortynnes i 100 ml fortynningsvæske Doser > 1500 mg fortynnes i 250 ml fortynningsvæske Maksimal konsentrasjon på ferdig løsning 15 mg/ml Infusjonsposer (Kevesy) er klare til bruk, skal ikke fortynnes videre	<u>IV infusjon:</u> Over minst 15 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Hetteglass:</u> 12 timer RT 24 timer K <u>Fortynnet</u> <u>løsning:</u> 24 timer RT	Kan gi hypotensjon, kramper, hodepine og somnolens. Legemiddelkonsentrasjonen kan monitoreres. Legemiddel med partikler eller misfarging skal ikke brukes.
Kilder: Statens legemiddelverk, norsk preparatomtale (SPC) Keppra og Kevesy Micromedex Levetiracetam Maler MetaVision				