



Legemidler - Blandekort, Pantoprazol

D46453

Utgave:
3.00Gjelder fra:
07.07.2024

Side 1 av 1

A02BC02	INTENSIV/SENGEPOST				
	PANTOPRAZOL Somac®, Pantoprazol®				
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
40 mg Inf.subst Hetteglass	40 mg tørrstoff løses i 10 ml NaCl 9 mg/ml (= 4 mg/ml)	<p>Kan gis uforynnet eller fortynnes videre</p> <p><u>Fortynningsvæske:</u> Natriumklorid 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml</p> <p><u>IV injeksjon:</u> Stamløsningen gis uforynnet.</p> <p><u>IV infusjon:</u> Konsentrasjon 0,4 mg/ml: 10 ml (40 mg) fortynnes i 100 ml fortynningsvæske*</p> <p>Konsentrasjon 0,8 mg/ml: 20 ml (80 mg) fortynnes i 100 ml fortynningsvæske</p> <p><u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Konsentrasjon 0,8 mg/ml: 80 mg fortynnes i 80 ml fortynningsvæske</p> <p>Konsentrasjon 1,6 mg/ml: 80 mg fortynnes i 30 ml fortynningsvæske</p>	<p><u>IV injeksjon:</u> Over minst 2-5 minutter</p> <p><u>IV infusjon:</u> Over minst 15 minutter</p> <p><u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Gis på volum- eller sprøytepumpe. Etter legens ordinasjon, vanligvis 8 mg/time</p>	<p>Holdbarhet er inkludert brukstid</p> <p><u>Stamløsning:</u> 12 timer RT</p> <p><u>Fortynnet løsning:</u> 12 timer RT</p> <p><u>Kontinuerlig infusjon:</u> 12 timer RT</p>	<p>Stamløsningen har klar eller gulaktig farge.</p> <p>OBS! Tromboflebitt.</p> <p>Ekstravasasjon kan gi vevsskade.</p> <p>*Ved bruk av NaCl 9 mg/ml som fortynningsvæske, kan hetteglasset løses direkte i posen</p>
<p>Kilder: Statens legemiddelverk preparatomtale (SPC) –Somac Injectable Medicines Administration Guide, University College London Hospitals 3. Ed. Lexicomp og King Guide via www.helsebiblioteket.no Maler i MetaVision</p>					