


Legemidler - Blandekort, Vasopressin

D46456

 Utgave:
3.00

 Gjelder fra:
20.11.2024

Side 1 av 1

H01BA01	INTENSIV			
	ARGIPRESSIN = VASOPRESSIN Empressin®			
Styrke	Stamløsning og videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
20 enheter(E)/ml (= 40 E/2 ml) Inf. kons. ampulle	Må fortynnes før bruk. <u>Fortynningsvæske:</u> Natriumklorid 9 mg/ml <u>Sprøytepumpe:</u> Konsentrasjon 0,8 E/ml: 40 enheter (= 2 ml) fortynnes i 48 ml fortynningsvæske	<u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Bør gis i SVK. Gis på sprøytepumpe. Etter legens ordinering. Vanlig dose ved septisk sjokk er 0,01-0,03 E/minutt	<u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning/kontinuerlig infusjon:</u> 24 timer i RT	Kan gi lokal vasokonstriksjon ved perifer administrering Ekstravasasjon kan gi vevsskade. Løsningen er klar og fargeløs. Ved misfarging eller partikler skal løsningen ikke brukes.
Kilder: Norsk preparatomtale (SPC), Empressin Micromedex via www.helsebiblioteket.no				