

→ Inngrep via livmorhalsen

Du skal til behandling/inngrep av livmoren din hvor det er nødvendig å gå gjennom livmorhalsen.

For å forebygge skade på livmorhalsen og forhindre komplikasjoner ved utvidelsen av livmorhalskanalen, ber vi om at du på forhånd tar et medikament som heter Misoprostol (Cytotec®).

Du må ikke være gravid ved inntak av cytotec.

Er du i tvil, må du ta en gravitest.

Cytotec® er et medikament som er laget for å forebygge magesår, men det virker også på livmorhalsen og fører til at livmorhalskanalen utvides.

☒ **Du har fått to tabletter Cytotec® 0,2 mg.**

To til fire timer før du skal til time på poliklinikken eller dagkirurgen, svelges begge tablettene med vann eller settes vaginalt i skjeden.

Skal du møte kl.07.30, holder det at du tar tablettene kl.06.00.

Du kan oppleve magesmerter/menstruasjonsliknende smerter. Du kan da ta 1g Paracet®.

Dersom du skal skifte spiral på poliklinikken, anbefaler vi at du tar 1g Paracet® 1 t før du har time.

Spør oss hvis du lurer på noe.

Vennlig hilsen

Gynekologiske/føde avdelinger, Sykehuset Innlandet

Tlf. 915 06 200 | www.sykehuset-innlandet.no