

Peritonealdialyse - Tilsetning av medikament i dialysevæske

D47986

 Utgave:
1.04

 Gjelder fra:
25.05.2023

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

- Sikre aseptisk tilsetning av medikament i dialysevæske hos pasienter i peritonealdialyse (PD).

Ansvar/målgruppe

- PD-sykepleiere, sykepleiere på sengepost, i sykehjem og hjemmesykepleie, samt pasienter/pårørende etter opplæring.

Handling

Utstyr

- Medikament (ordinert av lege)
- Natriumklorid/sterilt vann ved utblanding av tørrstoff. Se [Legemidler - Utblanding av antimikrobielle midler, injeksjon og infusjon](#)
- Sprøyte (størrelse tilpasset medikament)
- 2 sprøytespisser (opptrekkskanyler)
- 2 (3 ved tørrstoff) sterile kompresser 5x5 cm
- Klorhexidin sprit 5 mg/ml
- 1 pose forvarmet dialysevæske (væske forordnet av lege)
- Hansker (usterile)

Gjennomføring

- Vask hender og finn fram utstyr
- Ta på hansker
- Ved tørrstoff:
 - Vask med klorhexidinfuktet kompress rundt toppen av Natriumklorid/steriltvann-ampullen og vri av toppen
 - Vask av toppen av medikamentglasset med klorhexidinfuktet kompress, etter at beskyttelseshetta er fjernet
 - Koble sprøyten på ampullen og trekk opp væsken
 - Sett sprøytespissen på sprøyta og tilsett Natriumklorid/sterilt vann i medikamentglasset
 - Rist, la eventuelt stå litt, til pulveret har løst seg opp
 - Trekk opp medikamentløsningen i samme sprøyte

- Ved andre medikamenter:
 - Vask av toppen av medikamentglasset med klorhexidinfuktet kompress etter at beskyttelseshetta er fjernet
 - Trekk opp forordnet mengde medikamentløsning i sprøyta
- Vask tilsetningsstussen på dialysevæsken med klorhexidinfuktet kompress der medikamentet skal tilsettes
- Bytt til ny sprøytespiss
- Tilsett medikamentløsningen i dialysevæsken
- Snu litt på posen
- Knekk brytestiften/åpne skilleveggen mellom kamrene. Ved dialysevæskeposer fra Baxter må tilsetning gjøres før kamrene blandes. Hvis dette blir glemt, ta ny pose.

Generelt

- Tilsett aldri medikamenter i Nutrineal (dialysevæske)
- Ved tilsetninger av flere medikamenter i dialysevæsken, ta alltid ny sprøyte og spiss
- Benytt [Prinsipper for aseptisk teknikk ved ikke-kirurgiske prosedyrer](#) ved sammenkopling av sprøyte og sprøytespiss

Referanser

[SI/17.34-02](#)

[SI/17.34-01](#)

[SI/17.34-02](#)

[SI/21.01-23](#)

[SI/21.01-35](#)

[Prinsipper for aseptisk teknikk ved ikke-kirurgiske prosedyrer](#)
[Hånddesinfeksjon](#)

[Håndvask](#)

[Legemidler - Tilberedninger og tilsetninger, administrering av legemidler til injeksjon og infusjon](#)

[Legemidler - Tilberedning og håndtering av antimikrobielle midler](#)