

→ Svangerskap utenfor livmor - medikamentell behandling

Symptomene du har og de undersøkelser som vi har gjort, tyder på at du har et svangerskap utenfor livmoren. I de fleste tilfeller er graviditeten lokalisert i egglederen.

Dette kan noen ganger behandles med medikamenter i stedet for operasjon. Fordelen er at du slipper narkose og et kirurgisk inngrep.

Behandlingen gis som en sprøyte i låret eller øverst på baken. Medikamentet heter Methotrexat og er en cellegift som gjør at graviditeten går til grunne.

90 prosent av de som mottar medikamentell behandling oppnår normalisering av s-hCG uten behov for operativ behandling.

BLODPRØVEKONTROLLER

Alle Rh-negative med svangerskap utenfor livmoren skal ha en injeksjon med Rhesus profylakse uansett graviditetslengde eller behandlingsmetode.

4. og 7. dag etter at sprøyten ble satt tas blodprøver for å kontrollere resultatet av behandlingen. Iblant må behandlingen gjentas med ytterligere methotrexat injeksjoner.

Deretter skal du ta en blodprøve en gang i uken til verdiene er normalisert. Dette kan ta flere uker.

Du må regne med en del smerter nederst i magen de første dagene, men dette er ikke farlig. Ubehag som kvalme og oppkast, diare og magekatarr kan forekomme etter Methotrexat behandling.

Blir du imidlertid akutt dårlig med sterke magesmerter og/eller svimmelhet må du straks inn til sykehuset. Det er da sannsynlig at vi må gjøre en laparoskopisk (kikkhulls) operasjon.

I forbindelse med behandlingen må du ikke bruke alkohol.

Du skal ikke bruke Multivitaminer som inneholder folinsyre.

Du kan ikke amme de første fire døgnene etter Methotrexat injeksjonen.

Ny graviditet bør avventes i tre måneder.

Ta kontakt med din gynekologiske avdeling dersom du får forverrelse av symptomene, og vi vil undersøke deg med en gang.

Vennlig hilsen

Gynekologiske avdelinger, Sykehuset Innlandet

Tlf. 915 06 200 | www.sykehuset-innlandet.no