



Legemidler - Blandekort, Valproinsyre, valproat

D48313

Utgave:
3.00Gjelder fra:
07.07.2024

Side 1 av 1

N03AG01	AKUTTMOTTAK/INTENSIV/SENGEPOST			
	VALPROINSYRE (VALPROAT) Orfiril® (Desitin), Valproat® (Life Medical)			
Styrke	Fortynning	Administrering	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
100 mg/ml Injeksjons- væske Ampulle	Kan gis ufortynnet eller fortynnes videre <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV injeksjon:</u> Doser ≤ 900 mg kan gis ufortynnet. Doser > 900 mg gis ufortynnet i SVK eller fortynnet i en perifer vene <u>IV infusjon:</u> Dosen fortynnes i 100 ml fortynningsvæske (<i>minimum 50 ml</i>) <u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Konsentrasjon 50 mg/ml: 2400 mg (= 24 ml) fortynnes i 24 ml fortynningsvæske Konsentrasjon 12 mg/ml: 1200 mg (= 12 ml) fortynnes i 88 ml fortynningsvæske	<u>IV injeksjon:</u> Gis langsomt over 5-10 minutter. Maks 3 mg/kg/min <u>IV infusjon:</u> Gis over 60 minutter Maks 20 mg/min <u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Gis på sprøytepumpe eller volumpumpe etter legens ordinasjon.	Holdbarhet er inkludert brukstid. <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 12 timer RT <u>Kontinuerlig infusjon:</u> 24 timer RT	Obs! Tromboflebitt Ekstravasasjon kan gi vevsskade. Kan gi smerter på injeksjonsstedet. Legemiddelkonsentrasjon kan monitoreres
		Status epilepticus: Metningsdose 30 mg/kg gis <i>enten</i> ufortynnet på SVK over 10-15 minutter <i>eller</i> fortynnet i 100 ml fortynningsvæske på PVK over 10-15 minutter Etterfølges av kontinuerlig infusjon. Vanlig dose; 1-3 mg/kg/time		

Kilder:

 Norsk preparatomtale, SPC, [Orfiril](#)

Metodebok Epilepsi SSE/OUS juni 2024

 Norsk elektronisk legehåndbok, nevrologi – Nevro-NEL via www.helsebiblioteket.no desember 2019

Maler i MetaVision