



Gynekologi - Forbehandling av cervix

D48572

Utgave:
2.00Gjelder fra:
24.10.2024

Side 1 av 1

Hensikt og omfang

- Forebygge komplikasjoner i forbindelse med kirurgiske prosedyrer med cervix dilatasjon, som laserasjon av cervix, falske kanaler eller perforasjon av uterus.

Ansvar/målgruppe

- Leger og sykepleiere

Handling

Forbehandling med Misoprostol (Cytotec®)

- Cytotec® har mindre effekt hos postmenopausale kvinner, men kan benyttes spesielt ved lokal østrogenbehandling 14 dager før
- Hos nullipara vil dette være spesielt viktig og kan også benyttes ved innleggelse av IUD
- Pasienten får med seg Misoprostol (Cytotec®) 3 tabletter fra poliklinikken, eller får medikamentet tilsendt sammen med innkallingsbrev til poliklinisk konsultasjon. [Pasientinformasjon - Inngrep/behandling via livmorhalsen, forbehandling](#) legges ved innkallingsbrevet.
- Lege informere om dette ved bestilling av time

Dosering

- Misoprostol (Cytotec®) 600µg vaginalt eller per os 2 – 4 timer før prosedyre gjennomføres, ev. kvelden før

Referanser

[SI/17.10-42](#)[SI/17.10-43](#)[SI/17.28.03.10-07](#)[Gynekologi - Veileder](#)[Gynekologi - Gynekologisk kreft – handlingsprogram](#)[Pasientinformasjon - Inngrep/behandling via livmorhalsen, forbehandling](#)