

➔ Vevsprøve fra prostatakjertelen

VEVSPRØVE FRA PROSTATAKJERTELEN (Perinealebiopsier)

Etter prøvetakingen er det normalt å se litt blod i urinen, avføring og sædvæske. Dette kan vare i noen uker.

Det er ikke uvanlig med ømhet og hevelse i området bak pungen hvor prøvene er tatt.

Hvis urinen er blodtilblandet, kan du gjerne drikke noen glass ekstra for å øke urinproduksjonen. Dette gjelder ikke om du har fått beskjed om begrenset drikkemengde.

Vi anbefaler at du er i normal aktivitet uten større anstrengelser de første dagene etter undersøkelsen. Du skal ikke sykle i 3-4 dager. Det er ingen restriksjoner med tanke på seksuell aktivitet.

Det er svært sjelden at det oppstår alvorlige infeksjoner som følge av denne prøvetakingen.

Dersom du får symptomer som feber, frysninger og/eller generell sykdomsfølelse, skal du umiddelbart ta kontakt direkte med sykehuset.

Telefon

Hverdager (kl 08-15): 62 53 74 41 eller 482 70162

Kveld, natt, helg og helligdag: 62 53 71 20

Spør oss hvis du lurer på noe.

Vennlig hilsen

Kirurgisk avdeling, Sykehuset Innlandet Hamar

Tlf. 915 06 200 | www.sykehuset-innlandet.no