


Legemidler - Blandekort, Noradrenalin

D48835

 Utgave:
3.00

 Gjelder fra:
07.07.2024

Side 1 av 1

C01C A03	INTENSIV			
	NORADRENALIN Noradrenalin®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT = Romtemperatur	Merknader
1 mg/ml Infusjons- konsentrat, ampulle	Må fortynnes før bruk. <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>Sprøyteteppe:</u> Konsentrasjon 0,02 mg/ml: 1 mg (=1 ml) fortynnes med 49 ml fortynningsvæske Konsentrasjon 0,1 mg/ml: 5 mg (= 5 ml) fortynnes med 45 ml fortynningsvæske <u>Volumpumpe:</u> Konsentrasjon 0,02 mg/ml: 5 mg (= 5 ml) fortynnes med 245 ml fortynningsvæske Konsentrasjon 0,1 mg/ml: 10 mg (= 10 ml) fortynnes med 90 ml fortynningsvæske	<u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Skal administreres med volum- eller sprøyteteppe. Gis i SVK. <u>Infusjonshastighet:</u> Gis etter legens ordinasjon Vanligvis er anbefalt dosering mellom 0,05 mcg/kg/min til 2,0 mcg/kg/min	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning/ kontinuerlig infusjon:</u> 24 timer i RT	Ekstravasasjon kan gi vevsskade Perifer administrering kan gi lokal vasokonstriksjon. Kan unntaksvis gis i en stor perifer vene dersom pasienten ikke har SVK, i konsentrasjonen 0,02 mg/ml.
Kilder: Statens legemiddelverk, norsk preparatomtale (SPC) – Noradrenalin Injectable Medicines Administration Guide, 3rd ed. Maler I MetaVision				