

Operasjon - Plastikk fjernelse i ansikt

D50896

 Utgave:
1.01

 Gjelder fra:
04.04.2022

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

- Sikre at sykepleiere utfører prosedyren korrekt

Ansvar/målgruppe

- Sykepleier og lege ved kirurgisk poliklinikk Hamar.

Handling

- Sykepleier legger opp instrumenter, sjekker instrumenter og setter på knivblad
- Utfør identitets sjekk på pasient
- Legge pasienten i godt leie, desinfisere operasjonsfelt. Starte desinfeksjon sentralt i insisjonsområde, gå deretter utover med sirkulære bevegelser. Repetere 5 ganger. Ny tupfer ved hver repetisjon.
- Desinfeksjonsvæske som benyttes.
 - Ansikt: Nacl 9 mg/ml
 - Slimhinner: Klorhexidin 0:5 mg/ml
 - Øvrig kropp: Klorhexidin 5m/ml med eller uten farge
- Ved histologi, bruk glass med formalin

Utstyr

- Ansiktsbrikke
- Plastikk tralle
- Klinik duk 75x90 2 stk
- Klinik duk 75x75 med limkant 2 stk
- Standard frakker
- Vaskesett
- Steril tusj
- Oransje kanyle alt grå kanyle
- Opptrekkskanyle
- Sprøyte 5 cc luer løkk 1 stk
- Sprøyte 20 cc 1 stk
- Knivblad 15
- Lokalbedøvelse:
 - Lokalbedøvelse 20 ml Xylocain 10 mg/ml med adrenalin + 4 ml natriumhydrogenkarbonat 0.5mmol/ml
- Suturer: Spør operatør
- Bandasje: Opsite plasterspray, eventuelt Rudanath strips eller brun micropore tape.

Dekking

Operatør vil se hele ansiktet. Lag en trekant av 75x90 legg under pasientens hode og fest på toppen /panna med en pean.

Referanser