

**Legemidler - Blandekort, Vitamin B og C, Pabrinex, Syndrex**

D50901

 Utgave:  
3.00

 Gjelder fra:  
20.11.2024

Side 1 av 1

A11E B	SENGEPOST/INTENSIV				
	<b>PABRINEX (Vitamin B og C)</b> Pabrinex Intravenous High Potency (Kyowa Kirin, uregistrert), Syndrex (JSC Farmak, uregistrert)				
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
Infusjonskonsentrat Sett à to ampuller  <u>Ampulle 1 (5 ml) inneholder:</u> Tiamin (B1) 250 mg Riboflavin (B2) 4 mg Pyridoksin (B6) 50 mg  <u>Ampulle 2 (5 ml) inneholder:</u> Nikotinamid (B3) 160mg Askorbinsyre (C) 500 mg Glukose 1000 mg	Ampulle 1 og 2 <b>skal</b> trekkes opp (blandes) i samme sprøyte før videre fortynning	Må fortynnes før bruk*  <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml  <u>IV infusjon:</u> Stamløsningen fortynnes med 50-100 ml fortynningsvæske	<u>IV infusjon:</u> Over 30 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid  <u>Ampuller:</u> Engangsbruk  <u>Fortynnet løsning:</u> 7 timer i RT	Kan gi smerte på injeksjonsstedet.  Kan gi anafylaksi/ alvorlige allergiske reaksjoner.  Kan gi hypotensjon.  *Stamløsningen kan ved væskerestriksjoner gis ufortynnet på sprøytepumpe, etter legens forordning
<b>Kilder:</b> The electronic medicines compendium (emc), engelsk preparatomtale <a href="#">Pabrinex</a> NHS Injectable Medicines Guide The College London Hospitals University Pharmacy Department: Injectable medicines administration guide, 3rd ed. Wiley-Blackwell 2010					