

→ Solu-Medrol behandling

Dette er en behandling vi ofte gir mot en tilstand som kalles endokrin oftalmopati. Den vil blant annet kunne gi utstående øyne, tørrhetsplager, dobbeltsyn og affeksjon av synet. Sykdommen skyldes forstyrrelser i stoffskiftet. Målet med behandlingen er å bremse eller snu denne prosessen.

FØR BEHANDLING

I forkant av en behandling vil det være nødvendig med en større utredning av deg som pasient. Legen vil ta blodprøver og bilder av hodet og eventuelt lunger og leveren, samt forhøre seg som din generelle helse-tilstand. Om du er allergisk mot kumelk eller mistenker allergi mot kumelk ønsker vi at du informerer om dette, da legemiddelet inneholder laktosemonohydrat. Er du gravid eller ammer, ønsker vi også at du informerer om dette. Legemiddelet er overførbart i morsmelk.

BEHANDLINGEN

Behandlingen foregår over 12 uker med oppmøte på avdelingen en gang i uka. Før hver behandling tas det blodprøver for å kontrollere elektrolyttene i blodet ditt. Som regel vil du møte rett til time hos sykepleier, men underveis i behandlingen vil du også ha noen oppfølgingssamtaler med lege. Det kan være at du vil få resepter på andre legemidler de dagene du ikke får behandling på avdelingen. Dette avtaler du med legen som behandler deg.

FORSIKTIGHETSREGLER

Pasienter som behandles med Solu-Medrol er mer mottakelige for infeksjoner fordi legemiddelet demper immunforsvaret. Det kan bli vanskeligere å oppdage sykdom fordi infeksjonssymptomene slik som for eksempel feber, kan bli skjult.

Dersom du har mistanke om at du har en infeksjon i kroppen, er det derfor viktig at du oppsøker lege. Svie ved vannlatning eller langvarig hoste kan være tegn på infeksjon som du bør få undersøkt.

Skal du ta vaksiner under behandlingen, bør dette avklares med en lege. Det anbefales at man unngår levendebaserte eller svekkede vaksiner.

Har du diabetes, kan Solu-Medrol påvirke blodsukkeret ditt og forverre tilstanden. Det er derfor viktig å kontrollere blodsukkeret etter oppstart av behandling, og det kan bli økt behov for insulin eller blodsukker-senkende medisiner.

BIVIRKNINGER SOM KAN OPPSTÅ

Rundere ansikt, væskeopphopning generelt i kroppen, humørsvingninger, høyt blodtrykk, magesår, akne, lavere kaliumnivå i kroppen, katarakt, muskelsvakhet, benskjørhet, tynnere og skjørere hud som har lett for å få blåmerker. Det kan også ta lenger tid enn vanlig før huden heles om du får sår. Bivirkninger vil avhenge av dosering og varighet av behandlingen. Bivirkningene ovenfor er de vanligst rapporterte bivirkningene, men det betyr ikke nødvendigvis at du kommer til å oppleve disse. Opplever du bivirkninger informerer du om dette når du kommer til behandling.

Vennlig hilsen

Øyeavdelingen, Sykehuset Innlandet

Tlf. 915 06 200 | www.sykehuset-innlandet.no