


Legemidler - Blandekort, Sotrovimab

D51234

 Utgave:
2.00

 Gjelder fra:
09.01.2024

Side 1 av 1

J06B D05	Intensiv/Sengepost			
	SOTROVIMAB Xevudy®			
Styrke	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet RT= romtemperatur K = kjøleskap	Merknader
500 mg Infusjons- konsentrat	Må fortynnes før bruk. <u>Fortynningsvæske:</u> Natriumklorid 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml Ta ut hetteglasset fra kjøleskapet ca 15 minutter før fortynning. Før opptrekk av dose blandes innholdet i hetteglasset forsiktig ved å rotere på hetteglasset flere ganger. Ikke rist! 8 ml sotrovimab fortynnes i enten 42 eller 92 ml fortynningsvæske* Bland innholdet ved å forsiktig bevege posen frem og tilbake 3-5 ganger. Infusjonsposen må ikke snus/vendes (<i>dette for å unngå skumdannelse</i>).	<u>Kun til IV infusjon:</u> Benytt et in-line filter på 0,2 µm (<i>epiduralfilter</i>) Gis over 30 minutter.	Holdbarhet er inkludert brukstid. <u>Hetteglass:</u> Kun til engangsbruk. <u>Fortynnet løsning:</u> 6 timer RT 24 timer K	Løsning med partikler skal ikke brukes. Overskuddet i hetteglasset skal kastes. Batchnummer på hetteglasset skal registeres i pasientjournal. Pasienten skal observeres under pågående infusjon og i mist 1 time etter infusjonen er avsluttet. * Trekk ut og kast 8 ml fortynningsvæske av valgt pose (50 eller 100 ml) før tilsetning av infusjons- konsentratet.
Kilder: Norsk preparatomtale (SPC), Statens legemiddelverk – www.legemiddelverket.no januar 2022				