



Legemidler - Blandekort, Midazolam

D53191

Utgave:
1.00Gjelder fra:
02.01.2024

Side 1 av 1

Intensiv

N05C D08

MIDAZOLAM

Midazolam B.Braun®, Midazolam Panpharma®, Midazolam Accord®, Midazolam Accordpharma®

Styrke	Stamløsning Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = Kjøleskap RT = Romtemperatur	Merknader
1 mg/ml 5 mg/ml Inf. væske/ Inj. væske Ampulle og hetteglass	Kan brukes ufortynnet, eller fortynnes videre. <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9mg/ml (Glukose 50 mg/ml) <u>IV injeksjon:</u> Konsentrasjon 1 mg/ml: Gis ufortynnet eller fortynnes videre. <u>IV kontinuerlig infusjon, sprøytepumpe:</u> Konsentrasjon 1 mg/ml: Gis ufortynnet eller fortynning av 5 mg/ml løsning til 1 mg/ml: 10 ml av 5 mg/ml løsning blandes med 40 ml NaCl 9 mg/ml Konsentrasjon 5 mg/ml: Gis ufortynnet.	<u>IV injeksjon:</u> Gis langsomt, ca. 1 mg pr 30 sek. (Avhengig av alder, vekt og respons). <u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Skal administreres med sprøytepumpe. <u>Infusjonshastighet:</u> Etter legens ordinasjon. Vanlig startdose er 0,02 mg/kg/t. Vanlig doseringsområde er 0,05-0,6 mg/kg/t.	Holdbarhet er inkludert brukstid. <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Hetteglass:</u> 12 timer RT 24 timer K <u>Kontinuerlig infusjon:</u> 24 timer i RT	OBS! Tromboflebitt! Ekstravasasjon kan gi vevsskade. Kan gi hypotensjon, bradykardi og respirasjonsdepresjon. Intramuskulær injeksjon (dypt i stor muskel) er svært smertefullt og bør unngås om mulig. Subkutan injeksjon benyttes ved palliasjon.

Kilder:

SPC, Statens legemiddelverk: [Midazolam](#)eHåndbok OUS: [eHåndbok - Midazolam - blandekort for voksne, intensiv / overvåkning \(ous-hf.no\)](#)

Injectable Medicines Administration Guide, 3rd ed 2010

Injectable Drugs Guide