


Legemidler - Blandekort, Kalsiumglukonat SENGEPOST

D53635

 Utgave:
1.00

 Gjelder fra:
28.06.2024

Side 1 av 1

A12A A03 B05X A19		SENGEPOST		
		KALSIUMGLUKONAT Calcium Gluconate (B.Braun) - uregistrert		
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K= Kjøleskap RT= Romtemperatur	Merknader
10 % Tilsvarende 0,23 mmol kalsium/ml Inj.væske Ampulle, 10 ml	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV infusjon:</u> 10 ml (2,3 mmol) injeksjonsvæske fortynnes med 90 ml fortynningsvæske 20 ml (4,6 mmol) injeksjonsvæske fortynnes med 80 ml fortynningsvæske Hvis behov for påfølgende kontinuerlig infusjon, se blandekort for Intensiv	<u>IV inj</u> Anbefales ikke gitt på sengepost <u>IV infusjon</u> Etter legens ordinerings Anbefalt infusjonshastighet: Gis over 30 minutter I akutte situasjoner kan raskere infusjonshastighet brukes, maksimalt: 4,6 mmol kalsium/ 10 min (0,46 mmol kalsium/min)	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer i RT	OBS! Tromboflebitt! Ekstravasasjon kan gi vevsskade. Kan gi smerte på injeksjonsstedet Kan gi arytmier, hjertestans, perifer vasodilatasjon, hypotensjon og bradykardi EKG monitorering kreves ved høy infusjonshastighet Forlikelighet og tilsetningsgrenser må sjekkes nøye hvis kalsiumglukonat skal gis sammen eller parallelt med andre legemidler, elektrolytter eller parenteral ernæring

Kilder:

Blandekort OUS, [eHåndbok - Kalsiumglukonat - blandekort for legemidler til voksne, intensiv / overvåkning \(ous-hf.no\)](#)
 Legemiddelhandboka.no [Legemiddelhandboka \(legemiddelhandboka.no\)](#), T23.3.4 Hyperkalemi og T23.3.9 Hypokalsemi
 University College London Hospitals: Injectable medicines administration guide, 3rd ed. Wiley-Blackwell 2010
 Produktomtale B.Braun [Calcium Gluconate 10% B. Braun \(bbraun.com.my\)](#)
 Maler fra MetaVision