


**Legemidler - Blandekort, Dihydralazin**

D55475

 Utgave:  
1.00

 Gjelder fra:  
20.03.2026

Side 1 av 1

C02DB01	INTENSIV				
	DIHYDRALAZIN Nepresol				
Styrke	Stamløsning	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K=Kjøleskap RT=Romtemperatur	Merknader
Ampulle med tørrstoff, 25 mg  Ampulle med væske til injeksjon, 2 ml	Ampulle, 25 mg, løses i medfølgende væske, 2ml = Konsentrasjon 12,5 mg/ml	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml  <u>IV/IM injeksjon:</u> Kan gis ufortynnet  <u>IV infusjon:</u> <b>Konsentrasjon 0,1 mg/ml</b> 2 ml (=25 mg) av stamløsning fortynnes i 248 ml fortynningsvæske	<u>IM injeksjon:</u> Gis etter legens ordinasjon  <u>IV injeksjon:</u> Gis langsomt over 2 minutter  <u>IV infusjon:</u> Gis på volumpumpe etter legens ordinasjon	Holdbarhet er inkludert brukstid  <u>Ampuller:</u> Engangsbruk  <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer RT	Bruk PVC-frie infusjonsposer og infusjonssett. (Infusjonsposene fra B.Braun og Freeflex er PVC-frie.)  Må ikke blandes i glukose, da glukoseløsninger inaktiverer dihydralazin
<u>Kilder:</u> Tysk produktomtale, Teofarma S.r.l. Legemiddelhåndboka, <a href="#">Dihydralazin</a> Maler i MetaVision					