

**Legemidler - Blandekort, Ketamin**

D55477

 Utgave:  
1.00

 Gjelder fra:  
20.03.2026

Side 1 av 1

N01AX03	INTENSIV/ANESTESI			
	<b>KETAMIN</b> Ketalar®, Ketamin Abcur®			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K=Kjøleskap RT=Romtemperatur	Merknader
Hetteglass 10 mg/ml, 20 ml  50 mg/ml, 10 ml	<p><u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml</p> <p><u>IV injeksjon:</u> Kan gis ufortynnet, men maksimalt 10 mg/ml i perifer vene</p> <p><u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> Gis på sprøytepumpe</p> <p><b>Konsentrasjon 10 mg/ml</b> Løsning 10 mg/ml kan benyttes ufortynnet eller 10 ml av løsning 50 mg/ml (=500 mg) fortynnes i 40 ml fortynningsvæske</p> <p><b>Konsentrasjon 50 mg/ml</b> 50 mg/ml kan benyttes ufortynnet</p>	<p><u>IV injeksjon:</u> Gis langsomt, over minst 1 minutt</p> <p><u>Kontinuerlig IV infusjon:</u> Gis på sprøytepumpe etter legens ordinasjon</p>	Holdbarhet er inkludert brukstid  <u>Anbrutt hetteglass:</u> 7 dager i RT  <u>Kontinuerlig infusjon:</u> 24 timer i RT	Respirasjon, blodtrykk og puls må monitoreres.  Bivirkninger kan være hallusinasjoner og krampelignende muskelbevegelser, kvalme og oppkast
<p><b>Kilder:</b>            SPC, Direktoratet for medisinske produkter: <a href="#">Ketalar</a>            Maler i MetaVision</p>				