



Øye - Blepharochalase

D55792

 Utgave:
1.00

 Gjelder fra:
26.03.2026

Side 1 av 2

Definisjon	Fjerne overflødig hud på øyelokk
Instrumenter	
Dekking/Utstyr	<p>Elverum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plastic surgery eye pack • Instrumenter til små inngrep • Evt steril tusj • Evt. Westcott Tenotomy saks • Evt. Batteri Cauter eller Hyfrector 2000 m/diatermipinsett • Selvklebende hullduk Ø 6x15 cm hull • NaCl 9 mg/ml skyllevæske • Absorbent sticks (tannlegedotter) • Store tupfere, 1 pakke • Steri-strips + evt. brun micropore tape • Tillegg ved nedre blepharochalase <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 rett saks ○ 1 steril merkepenn <p>Lillehammer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plastic surgery eye pack • Epidural drape 75x80 • Instrumentskrin merket "Plast.opr" • Steril merkepenn • Diatermipinsett + Hyfrector 2000 (engangscauter ved behov) • NaCl 9mg/ml • Brun micropore til taping av såret
Knivblad	<ul style="list-style-type: none"> • Nr. 15
Suturer	Optilene 6/0
Preoperativ forberedelse	<p>Elverum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gi premedikasjon; 1 g Paracet per os • Lege merker av hud med merkepenn og benytter evt. Anatomisk pinsett. Pasienten <u>sitter</u> når legen merker av området som skal opereres. • Informere muntlig om inngrepet og gi informasjonsskriv: Pasientinformasjon - Tunge øyelokk • Forberedelse i operasjonsslusa <ul style="list-style-type: none"> ○ Hette over håret ○ Frakk (på stue 1 og 2) <p>Lillehammer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollere pasientens identitet og aktuelle øye

	<ul style="list-style-type: none">• Hette over håret Anestesi Elverum/Lillehammer: Dråper: <ul style="list-style-type: none">• Tetrakain 1% eller Oxibuprokain 4mg/ml Lokal injeksjon: <ul style="list-style-type: none">• Xylokain 20 mg/ml med adrenalin 0,005 mg/ml (Evt Lidocain 20mg/ml)
Leiringsutstyr	
Leiring	Ryggleie
Huddesinfeksjon	Jfr. Prosedyre: Øye - Preoperativ desinfeksjon med Klorhexidin 1mg/ml
Dekking	
Drenasje	
Bandasje	
Merknader	Pasienten skal sitte med kjølemaske over øyenen i 20 – 30 minutter etter operasjonen. Legg en steril kompress mellom maske og operasjonsfelt
Arbeidsbeskrivelse	

Referanser[SI/17.26-16](#)[SI/17.28.03.26-13](#)[Øye - Preoperativ desinfeksjon med Klorhexidin 1mg/ml](#)[Pasientinformasjon - Tunge øyelokk](#)