



Legemidler - Blandekort, Flumazenil

D56180

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
20.07.2026

Side 1 av 1

V03A B25	ANTIDOT			
	FLUMAZENIL			
	Flumazenil Hammeln, Flumazenil Fresenius Kabi, Flumazenil Aurora Medical			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = kjøleskap RT = romtemperatur	Merknader
Inj.væske 0,1 mg/ml Amp, 5 ml	Gis ufortynnet eller fortynnes videre <u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV injeksjon:</u> Gis ufortynnet <u>IV kontinuerlig infusjon, volumpumpe:</u> Konsentrasjon 0,01 mg/ml 10 ml (1 mg) fortynnes med 90 ml fortynningsvæske <u>IV kontinuerlig infusjon, sprøytetpumpe:</u> Konsentrasjon 0,1 mg/ml Gis ufortynnet	<u>IV injeksjon:</u> Gis over 30 sekunder <u>IV kontinuerlig infusjon, volum- og sprøytetpumpe:</u> Gis etter legens ordinasjon	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer i RT	Antidot ved benzodiazepinforgiftning
<u>Kilder:</u> Produktomtale, SPC, Direktoratet for medisinske produkter: Flumazenil Hammeln , Flumazenil Fresenius Kabi Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten) - Helsebiblioteket				