



Legemidler - Blandekort, Deferoksamin

D56182

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
20.07.2026

Side 1 av 1

V03AC01	ANTIDOT				
	DEFEROKSAMIN				
	Desferal Novartis Mitem Pharma® og Desferal 2care4®				
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = kjøleskap RT = romtemperatur	Merknader
Inf.subst. 500 mg Hgl	<u>Oppløsningsvæske:</u> Sterilt vann Hetteglass løses i 5 ml oppløsningsvæske*	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml Glukose 50 mg/ml <u>IV infusjon:</u> Beregnet dose fortynnes i 100-500 ml fortynningsvæske	<u>IV infusjon:</u> Gis på volumpumpe etter legens ordinasjon Vanlig anbefalt startdose er 15 mg/kg/time	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Fortynnet løsning:</u> 12 timer i RT	Antidot ved alvorlig jernforgiftning *OBS fortrengningsvolum. Gir totalt volum 5,3 ml i hetteglass (konsentrasjon 95 mg/ml) etter rekonstituering Doserelatert hypotensjon, økt risiko ved høy infusjonshastighet. Allergiske reaksjoner Farger urinen rød
Kilder: Produktinformasjon, SPC, Direktoratet for medisinske produkter: Desferal Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten) - Helsebiblioteket					