

Legemidler - Blandekort, Diazepam

D56184

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
20.07.2026

Side 1 av 1

N05BA01	DIAZEPAM Diazepam-Lipuro B.Braun Melsungen (ureg)			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = kjøleskap RT = romtempert	Merknader
Inj.væske, emulsjon 5 mg/ml (10 mg/2 ml) Amp, 2 ml	<u>Fortynningsvæske:</u> Glukose 50 mg/ml <u>IV/IM injeksjon:</u> Gis ufortynnet <u>IV infusjon:</u> Ordinert dose fortynnes til konsentrasjon 100-400 mcg/ml	Gis i stor vene <u>IV injeksjon:</u> Gis langsomt over 2-5 minutter, ikke mer enn 1 mg/minutt* <u>IM injeksjon:</u> Gis langsomt i en stor muskel <u>IV infusjon:</u> Gis på sprøyte- eller volumpumpe etter legens ordinasjon	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 6 timer i RT	Antidot. Til behandling av kramper og uro i forbindelse med forgiftning IV/IM administrering kan være smertefull (fettløsning) *Kan i enkelte tilfeller gis opptil 5 mg/minutt
Kilder: Engelsk produktomtale, SmPC: Diazepam-Lipuro Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten) - Helsebiblioteket Medicines Complete, Injectable Drugs Guide				