

Legemidler - Blandekort, Digitalis antistoff

D56208

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
18.07.2026

Side 1 av 1

V03A B24	ANTIDOT				
	DIGITALIS ANTISTOFF				
	Digifab Protherics (ureg)				
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = kjøleskap RT = romtemperatur	Merknader
Inf.subst 40 mg Hgl.	<u>Oppløsningsvæske:</u> Sterilt vann Hvert hetteglass løses i 4 ml oppløsningsvæske	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml <u>IV injeksjon:</u> Gis ufortynnet <u>IV infusjon:</u> Fortynnes videre til egnet volum	<u>IV bolus:</u> Gis over 5 minutter <u>IV infusjon:</u> Gis over 15-30 minutter*	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Stamløsning:</u> 4 timer K <u>Fortynnet løsning:</u> Brukes umiddelbart	Antidot ved alvorlig digitalisforgiftning OBS risiko for anafylaksi/hypersensitivitet *Bør gis langsomt pga risiko for infusjonsrelaterte allergiske reaksjoner Kontinuerlig EKG-monitorering
<u>Kilder:</u> Produktomtale, SmPC: DIGIFab Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten) - Helsebiblioteket Maler i MetaVision					