

Legemidler - Blandekort, Huggorm antiserum

D56209

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
18.07.2026

Side 1 av 1

J06A A03	ANTIDOT			
	VIPERFAV			
	Viperfav Micropharm (Ureg)			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = kjøleskap RT = romtemperatur	Merknader
Inf.kons. Ampulle, 4 ml	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml <u>IV infusjon:</u> 4 ml fortynnes i 100 ml fortynningsvæske	<u>IV infusjon:</u> Start langsomt med 15 dråper/minutt eller 50 ml første 10 minutter. Dersom ingen tegn til allergiske reaksjoner, øk infusjonshastigheten. Gi hele dosen over totalt 60 minutter	Holdbarhet er inkludert brukstid <u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> Brukes umiddelbart	Huggorm antivenin Kan gi anafylaksi/alvorlige allergiske reaksjoner
Kilder: Produktomtale, SPC (via Alliance Healthcare) Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten) - Helsebiblioteket				