

Legemidler - Blandekort, Metylenblått, Metyltionin

D56210

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
18.07.2026

Side 1 av 1

V03AB17	ANTIDOT			
	METYLENBLÅTT/METYLTIONIN Methylthioninium chloride Proveblue			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = kjøleskap RT = romtemperatur	Merknader
5 mg/ml Inj. væske	<u>Fortynningsvæske:</u> Glukose 50 mg/ml	Bør gis i stor perifer vene eller SVK	Holdbarhet er inkludert brukstid	Til bruk ved methemoglobinemi
Ampulle, 2 og 10 ml	<u>IV injeksjon:</u> Gis ufortynnet eller fortynnet med egnet volum, inntil 50 ml <u>IV infusjon:</u> Blandes i 100 ml fortynningsvæske <u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Blandes i 50 - 100 ml fortynningsvæske	<u>IV injeksjon:</u> Gis over minst 5 minutter <u>IV infusjon:</u> Gis over 30 minutter <u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Bruk sprøyte- eller volumpumpe. Vanlig startdose 0,1 mg/kg/time	<u>Ampuller:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> Brukes umiddelbart	Vesirriterende Løsningen er hypoton og kan gi smerter ved injeksjon OBS Må verken fortynnes i eller skylles med NaCl pga risiko for utfelling
Kilder: Produktomtale, SPC, Direktoratet for medisinske produkter: Methylthioninium chloride Proveblue Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten) - Helsebiblioteket Medicines Complete, Injectable Drugs Guide Maler i MetaVision				