



Legemidler - Blandekort, Obidoksim

D56211

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
18.07.2026

Side 1 av 1

V03A B13	ANTIDOT			
	OBIDOKSIM Toxogonin (ureg)			
Styrke	Fortynning	Administrasjon	Holdbarhet K = kjøleskap RT = romtemperatur	Merknader
250 mg/ml Inj.væske	<u>Fortynningsvæske:</u> NaCl 9 mg/ml	<u>IV injeksjon:</u> 250 mg eller 4 mg/kg gis langsomt over 5-10 min	Holdbarhet er inkludert brukstid	Kan gis IM hvis IV-inngang ikke er tilgjengelig
Ampulle, 1 ml	<u>IV injeksjon:</u> Kan gis ufortynnet eller blandes med 5-10 ml fortynningsvæske <u>IV kontinuerlig infusjon:</u> Blandes med passende volum av fortynningsvæske	<u>IV infusjon:</u> 750 mg/24 timer eller 0,5 mg/kg/time gis i minst 24 timer og inntil klinisk bedring Benytt sprøyte- eller volumpumpe	<u>Ampulle:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning:</u> 24 timer i RT	Atropin må gis før og samtidig med obidoksim, se retningslinjer fra Giftinformasjonen
<u>Kilder:</u> Produktomtale, SPC, Toxogonin (via Alliance Healthcare) Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten) - Helsebiblioteket Giftlinien for læger, DK Antidot Region Jönköpings län: Toxogenin				